

RELAIS, L'INFO

— CLUB DES RELAIS JARDIN ET COMPOSTAGE —

JUIN 2016



LES INITIATIVES DES MEMBRES

Avec près de 2000 hectares de réserve naturelle, Strasbourg dispose de forêts exceptionnelles. Un trésor est à ses portes : il appartient à tous d'en profiter et de le préserver!

En 2014, la Ville de Strasbourg a remporté le 5e concours récompensant les collectivités locales qui s'engagent dans la préservation de la biodiversité et a été nommée Capitale française de la biodiversité.

Une faune et une flore pléthoriques existent dans les réserves. 13 espèces végétales protégées à l'échelle nationale ou régionale ont été répertoriées comme par exemple : l'Aster amelle (*Aster amellus*), le Butome étoilé (*Butomus ombellatus*), l'Orchis incarnat (*Orchis incarnata*), l'Œillet superbe (*Dianthus superbus*), l'Iris de Sibérie (*Iris sibirica*) ou bien encore le Pigamon à feuilles d'ancolie (*Thalictrum aquilegifolium*).

Dans le massif forestier de la Robertsau : 33 espèces de papillons de jour et 20 d'orthoptères (criquets) inventoriées depuis 2008, 48 espèces d'oiseaux nicheurs, dont 39 espèces forestières et 9 liées aux cours d'eau, 3 espèces de reptiles et 6 d'amphibiens et 22 espèces de poissons.

Dans le massif forestier du Neuhof : 40 espèces de libellules, 22 d'orthoptères et 44 de papillons de jour, 4 espèces de reptiles et 5 espèces d'amphibiens, 18 espèces de poissons.

Dans la réserve naturelle de l'île du Rohrschollen : 57 espèces d'oiseaux nicheurs, 10 espèces d'amphibiens et 4 de reptiles, 45 espèces de papillons de jour et 27 d'orthoptères présentes au sein des milieux prairiaux, 42 espèces de libellules qui fréquentent les zones humides, 27 espèces de poissons au sein du réseau hydrographique interne de l'île et du Vieux-Rhin, 10 espèces de chauve-souris inventoriées.

Pour en savoir plus: <http://www.strasbourg.eu/fr>

(Extraits de Strasbourg Magazine d'avril 2016)

DES NOUVELLES DU CLUB

Le Club compte 180 membres!



Les rendez-vous du Club sur le plateau de France 3 Alsace; c'est une fois par mois!

Pour revoir l'émission: <http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/alsace-matin>

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

Au programme de ce mois

Des nouvelles du Club	page 1
Les initiatives des membres	page 1
Infos, côté jardin	page 2
- Le jardin en Juin	
Une maladie, un ravageur	page 7
- La Psylle du poirier	
Plus d'infos	page 8
- le vinaigre blanc	
Relais les annonces	page 9


INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin en Juin

Les arbres, arbustes et arbrisseaux



Les rosiers sont en pleine floraison et leurs senteurs se diffusent dans les allées du jardin. Malheureusement de nombreuses variétés sont très belles mais ne sentent rien! Comment les tailler une fois la floraison passée afin de faciliter une nouvelle? Plus les feuilles sont proches des boutons floraux, plus le nombre de folioles diminue. Les rosiers ayant fleuri sont alors taillés juste après la vraie feuille, souvent constituée de 5 folioles.



Les arbustes à feuilles sont taillés à besoin et ceux à fleurs le sont après leur floraison. La taille concerne les formes géométriques (forme au carré, art topièrè ...) ou libres (haie champêtre constituée de plantes horticoles ou sauvages, ...). Les déchets de tailles ramassés et broyés grossièrement à la tondeuse thermique servent de paillis dans le potager ou rejoignent l'aire de compostage. Broyés plus finement au broyeur à végétaux, les déchets de tailles



mis en tas montent rapidement en température, ce qui accélère leur décomposition.

Le jardinier n'a pas besoin de «traiter» ses arbres ou ses arbustes. Les attaques des prédateurs sont souvent stoppées par les auxiliaires (coccinelles, guêpes solitaires, forficules, ...). Au quotidien, le sécateur permet d'enlever les parties malades. Ces dernières sont compostées si la méthode de compostage permet une forte élévation de la température sur plusieurs jours. Elles peuvent être déposées dans un autre espace du jardin comme le potager. Les feuilles malades sont ingurgitées par les lombrics terrestres, véritables aseptiseurs au service du jardinier!

Regard anxieux sur le sureau ou sur la viorne boule de neige!

Ces arbustes communs des haies et des jardins sont facilement envahis par des pucerons noirs. Certaines jeunes branches sont couvertes de "manchons" d'insectes sur plusieurs dizaines de centimètres. Ces invasions n'empêchent pas le développement ou l'accroissement de ces arbustes. Par contre, ces légions de pucerons sont un garde-manger de choix pour les auxiliaires du jardinier (coccinelles, syrphes, ...). Ils sont ainsi sédentarisés dans le jardin pour dévorer les pucerons des haricots, des fèves, des pommers ou des cerisiers.



En fonction des secteurs, les quantités de fruits à venir sont peu à très abondantes. C'est très mauvais du côté des **arbres fruitiers à noyaux** (cerisiers, pruniers, ...).



De nombreux **pommiers** sont couverts de fruits au stade phénologique "petits fruits" (photo). Il faudra attendre la chute physiologique de ce mois avant d'enlever les excès par éclaircissage (couper la pomme en 2 au

couteau). Cette chute est le résultat du bilan comptable de l'arbre sur ses capacités à nourrir tout le monde !

Côté prédateurs, les pelotes de feuilles **de cerisiers** causées par les attaques de pucerons noirs sont traitées le soir grâce à la phytothérapie (infusion de mélisse, de sauge, ...) ou au savon noir (15 à 30g/litre d'eau) sauf en présence d'auxiliaires comme les larves de coccinelles. Il en est de même pour les pucerons verts des pruniers ou les pucerons verts ou mauves des pommiers. Les pousses oïdiées (feutrage blanc) sont éliminées à la main. Les bandes engluées entourant les troncs pour stopper la montée des fourmies élèveuses de pucerons sont couvertes de cadavres de ces premières; le jardinier doit remettre de la glu.

Les fraisiers non remontants sont en production (photo). Le jardinier profite de la récolte pour enlever les plantes indésirables qui ont poussé entre les pieds. Il rajoute aussi des aiguilles de pin ou de sapin pour limiter les attaques des limaces et pour que les fraises ne "traînent" pas dans la terre.



Les groseilliers ou les cassisiers déploient de longues grappes. Certaines rougissent ou noircissent déjà ce mois. Les pucerons jaunes sont stoppés grâce à la phytothérapie ou à une pulvérisation de savon noir (15 à 30 g/litre d'eau). Des tontes de gazon sont déposées aux pieds (1 à 2 cm d'épaisseur) pour reconstituer la litière.

Côté pieds **de myrtilles** (bleuets), des apports d'épines ou d'aiguilles de conifères renforcent l'acidité du sol indispensable à ces plantes acidophiles.

Les ronces, avec ou sans épines (photo), finissent leur floraison.

Les pousses qui se couvriront de fruits en 2017 sont en plein développement. Le jardinier veille à ne pas les endommager avec la tondeuse; il les guide et les attache provisoirement sur les fils ou les piquets.



Les framboisiers remontants produisent déjà! **Les framboisiers non remontants** (photo) sont en fin de floraison en ce début de mois; les cueillettes commenceront fin juin.



Des apports de broyat, de feuilles ou de tontes de gazon desséchées sont nécessaires aux pieds pour prévenir la sécheresse estivale. Celle de juillet 2015 a été redoutable!



Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique. Une nouveauté pour 2016! L'espace "Soupe de courges" arrive sur la table des jardins. Il a les mêmes caractéristiques que l'espace Ratatouille; il peut d'ailleurs s'y substituer.

- L'espace « Ratatouille »: tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
- L'espace « Plat gros volumes »: pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.
- L'espace "Soupe de courges": toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades et les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire en juin ?

Espace "Ratatouille" ou "Soupe de Courges"

L'ail, l'oignon et l'échalote sont en « feuilles ». Le sol doit être laissé nu. Les plantes indésirables sont éliminées en grande majorité. Si elles sont montées en graines: les mettre dans un seau et remplir d'eau pour les faire fermenter pendant 10 jours. Après, ce purin est déversé dans l'aire de compostage; les graines ont perdu leur pouvoir germinatif.

Sur le reste de l'espace « Ratatouille », tout est presque planté en ce début de mois! Les épisodes pluvieux et violents ont affaibli les différentes plantes de cet espace et en particulier les tomates. Elles sont jaunes, pâles, ... Avec le très attendu réchauffement du sol, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir! Un arrosage toutes les semaines avec un extrait fermenté d'ortie ou de consoude (dilution à 20%), seuls ou en mélange, donne un coup de fouet.



Les courgettes non coureuses plantées tous les mètres émettent leurs premières fleurs. Attention aux limaces ! Les feuilles jaunies ou couvertes d'un feutrage blanc sont éliminées. Pulvérisez les pieds avec un mélange d'eau et de lait, moitié-moitié.

Les aubergines commencent à pousser. Attention aux doryphores !

Attention aussi aux limaces qui adorent les feuilles des poivrons et des piments.

Aux pieds des courgettes, des tomates, des poivrons ou des aubergines, il faut compléter le paillage avec les déchets verts du moment (tontes, déchiquetât de

tailles d'arbustes, ...).

Sous une tonnelle ou un tunnel, ces légumes-fruits poursuivent leur développement avec l'arrivée des premiers fruits !

Cet espace sert, encore et encore, à repiquer les salades et à jeter entre les plantes quelques graines de radis dans les parties vides.



La sauge, le romarin ou le thym bouturés au printemps commencent à prendre du volume. Le jardinier poursuit le semis d'autres plantes aromatiques : persil frisé ou plat, cerfeuil, coriandre, aneth, basilic,

Concernant l'espace "Soupe de courges" qui répond aux mêmes exigences que l'espace "Ratatouille", les courges repiquées en mai se développent bien.

3 à 5 granulés d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur des pots percés entourant les plantes. Le paillis de déchets verts est complété en continu pour maintenir une épaisseur supérieure à 5 cm.



Espace "Potée"

Ce mois, les carottes tardives (photo) sont encore semées en semis clairs (30 cm au maximum entre les rangs). Le choix peut se porter sur des carottes fourragères comme la carotte jaune du Doubs ou la carotte blanche à col vert. Elles ne sont pas si fourragère que ça! Pour celles semées depuis mars, le jardinier dépose entre les rangs des tontes de gazon en très fine couche. L'éclaircissage des semis de mai se fait « en souffrance par le jardinier » en laissant un plant tous les 5 à 10 cm.

Les semis de panais d'avril sont éclaircis de 15 à 20 cm sur le rang.

Les premiers poireaux et les choux (Chou-fleur, brocoli, chou rouge, vert, de Milan, cabus, ...) sont repiqués en respectant les distances de plantation.

Les choux-raves, choux-navets, les choux à feuilles ou de Bruxelles peuvent être encore semés en juin.

Les céleris-raves

(photo) repiqués en mai démarrent

lentement après les coups de

froids de mai. Les feuilles jaunes sont éliminées. Entre les rangs, la terre est enrichi de compost puis couvert de paillis de déchets verts du moment.

Les topinambours (photo) ou les crosnes commencent à prendre du volume, surtout les premiers. Attention, les campagnols raffolent de ces légumes!



Attention, si les semis de carottes ou de panais n'ont pas levé après 4 semaines; il faut ressemer ou ... repiquer des poireaux dans les trous. L'honneur est sauf!



Les plants de concombres (photo) ont été repiqués en mai; ils peuvent l'être encore en juin. Si les feuilles se couvrent de blanc, il faut les pulvériser d'un mélange de lait et d'eau.



Espace "Plat gros volumes"



Les pommes de terre (photo) se développent avec les épisodes pluvieux et le réchauffement des températures. Attention aux doryphores et au mildiou.

Les haricots nains demandant un sol bien réchauffé pour germer ont souffert en mai. Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 1er août. Le jardinier ayant semé des haricots à rames doit enfoncer les piquets de 2 à 3m s'il ne l'a pas encore fait. 2 à 3 mois sont nécessaires entre semis et récoltes.

Les petits-pois, rames ou nains, et les fèves se développent rapidement. Ils sont en fleurs et les premières gousses ont été dégustées. Les pucerons noirs sont combattus avec du savon noir (15 à 30g/litre d'eau).

Les parties vides de l'espace « Plat gros volume » peuvent être consacrées aux légumes à pousse rapide comme les salades ou les radis.

Les pommes de terre peuvent être mélangées aux petits-pois ou aux haricots rames (photos). La production est optimisée en surface et aussi en volume!



Concombres Topinambours et Crosnes	Carottes	Petits-pois et fèves	Pommes de terre	Plantes aromatiques	Courgettes	Différentes variétés de courges, de potirons, de citrouilles, ...
	Panais		Haricots nains		Tomates	
	Plantation de poireaux		Haricots rame		Tomates	
	Choux		Semis de Haricots nains		Aubergines	
	Céleris		Pommes de terre		Tomates	
	Carottes		Haricots nains		Poivrons	
	Choux		Salades		Tomates	
	Salades		Semis de Haricots nains		Courgettes	
	Semis de Carottes		Pommes de terre		Ail, oignon et échalote	
	Plantation de Choux					
Espace « Potée »		Espace « Plat gros volumes »		Espace « Ratatouille »		Espace « Soupes de courges »
Travaux du mois de JUIN ou encore possibles ce mois (en blanc)						

Les massifs de plantes ou de fleurs

Le jardinier transplante en pleine terre différentes plantes horticoles ou sauvages: achillée, capucine, cléome, cosmos, lavatère, lin, œillet d'Inde, pétunia, reine-marquerite, souci, ...

Les fleurs sont aussi au potager (photos)!



La pelouse

Juin est, toujours et encore, le mois des tontes à 60 mm. En dessous de cette hauteur, l'herbe pousse encore plus! Ces déchets très azotés sont déposés aux pieds des arbustes (couches de 3 à 5 cm). Ils sont aussi étendus en fines couches sur le potager (1 cm). Si la pelouse présente de nombreux espaces

sans herbes, le jardinier peut acheter de la « semence de regarnissement » ou ne pas tondre à proximité pour laisser monter les graminées en graines. La future « pluie » de semences sera très efficace, adaptée au type de sol, avec les mêmes variétés de graminées et surtout gratuite !

L'aire de compostage

Le compostage en tas ou en bac poursuit son activité. Il est important de bien brasser les déchets en surface du bac, à la fourche et 1 à 2 fois par semaine. Les déchets de « 3 mois d'âge » peuvent être épandus entre les légumes comme paillis nourricier.



Comment gérer son jardin avec la Lune !

	Juin 2016	Juillet 2016
Jours "Feuilles"	1,2,8,9,18,19,27,28,29	6, 16,17, 24, 25, 26
Jours "Fruits"	5,10,11,12,20,21,22,30	7, 8, 9 18, 19, 27
Jours "Racines"	4,5,13,14,15,23,24	1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 30
Jours "Fleurs"	7,16,17,18,25,26	4, 5, 14, 15, 22, 23, 31

Lune descendante
du 6 au 20 juin, du 4 au 17 juillet
et le 31 juillet

Lune ascendante
du 1 au 5 juin, du 21 juin au 3 juillet et
du 18 au 30 juillet

Quelques explications!

Passage de la Lune devant les constellations: Lorsque la Lune pénètre dans un signe zodiacal, elle active l'élément concerné: Feu, Terre, Air ou Eau. La période est favorable pour planter, cultiver et récolter les plantes concernées par tel ou tel élément; elle

- Jours "Fruits": Aubergine, cucurbitacées, fève, fraisier, haricot, maïs, piment, pois, tomate et céréales.
 - Jours "Racines": Ail, betterave, carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, crosne, échalote, endive (semis), navet, oignon, panais, persil tubéreux, pomme de terre, radis, salsifis, rutabaga, scorsonère, topinambour, engrais verts.
 - Jours "Fleurs": Plantes mellifères, plantes aromatiques dont on récolte les fleurs, fleurs ornementales, chou-fleur, chou-brocoli, chou-romanesco,...
 - Jours "Feuilles": Plantes aromatiques, arroche, artichaut, asperge, blette, cardon, céleri-branché, chicorée, chou de Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non, cresson, endive (forçage), épinard, fenouil, laitue, mâche, oseille, pissenlit, poireau, poirée, pourpier, rhubarbe, roquette, tétragone.
- ne ainsi un jour "feuilles", "fruits", "racines" ou "fleurs".

- Lune descendante: Période favorable à l'activité racinaire DONC à la plantation, (arbres, légumes, ...), à l'éclaircissage, au repiquage, au marcottage, bouturage, à la division, au rempotage, à la récolte des légumes racines, à la coupe du bois, à la tonte, à l'élagage, à la taille, au buttage, au paillage, au travail du sol et à sa fertilisation, et au traitement.
- Lune ascendante: Période favorable à la montée de sève dans les parties aériennes de la plante DONC au semis, à la récolte des légumes-feuilles et des légumes-fruits, au prélèvement des greffons et au greffage.

PLUS D'INFOS sur... !

Comment désherber avec le vinaigre blanc ?

Son action : Le vinaigre blanc vendu dans le commerce est une dilution d'acide acétique à 8 ou 10% en général. C'est un herbicide de contact, c'est-à-dire qu'il brûle les parties aériennes avec lesquelles il est en contact ; mais aussi systémique : véhiculé par la sève il détruit la plante dans son intégralité. Ainsi il est très efficace contre les mousses et sur les plantes annuelles dont il détruit les jeunes pousses jusqu'à la racine.

Recette : De nombreuses recettes « de grand-mère » existent, et se différencient par le dosage. Ainsi certains l'utilisent pur d'autre plus ou moins dilué. Aussi nous vous conseillons de commencer par une dilution à 50% : un volume de vinaigre pour un volume d'eau. Si le résultat n'est pas satisfaisant vous pourrez doubler le volume de vinaigre. De plus pour rendre cette dilution plus adhérente au feuillage, il est recommandé d'ajouter un produit mouillant comme par exemple du savon noir. Ainsi le vinaigre sera moins lessivable par l'eau de pluie et donc plus efficace.

Utilisation : Pour désherber allées, chemins, massifs... vous avez deux possibilités :

- Arrosage au vinaigre aux pieds des plantes indésirables
- Pulvérisation du feuillage. Dans les deux cas, le résultat est grandement amélioré si vous procédez par une journée ensoleillée. Les herbes spontanées (mauvaises herbes) se flétriront presque instantanément, et seulement un ou deux jours seront nécessaires pour leur totale disparition.

Attention : Tester l'action du vinaigre blanc sur une dalle ou sur une dizaine de pavés avant l'application sur la totalité de la surface. Cette précaution permet d'anticiper toute action néfaste de ce produit sur la pierre.

Texte: <http://www.jardiniers-professionnels.fr/desherber-avec-le-vinaigre-blanc>

UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

La Psylle du Poirier

Le psylle du poirier est un insecte piqueur suceur qui cause des dégâts comparables à ceux des pucerons. La sève que boivent ces insectes est transformée en miellat qui tombe sur tout ce qui se trouve sous la colonie. La fumagine s'y installe parfois. Tous ces dégâts peuvent affaiblir l'arbre lorsque la colonie est très grande.

Biologie

L'adulte ressemble à une petite cigale aux ailes translucides (photo). Les insectes, lorsqu'ils se déplacent en groupes importants, émettent un bruit clairement perceptible.

L'adulte hiverne dans les vergers, sur les arbres hôtes, mesure 2,7 à 3,0 mm de long et porte d'étroites bandes sombres transversales sur l'abdomen. Il reprend son activité dès janvier et commence à s'alimenter avant la période d'accouplement. La femelle pond ses œufs par groupes de 6 à 10, à la base des bourgeons et le long



Les femelles des générations suivantes sont plus petite et de teinte plus claire, elles pondent sur les organes verts et sur les pédoncules floraux. Chaque femelle peut pondre de 400 à 600 œufs.

Ces œufs sont oblongs (0,3 x 0,1 mm). Blancs au moment de la ponte, ils deviennent jaunes puis orange. Ils présentent un petit filament à l'une des extrémités. Les œufs éclosent 6 à 25 jours après la ponte, selon la température.

Les larves sont plates et de couleur d'abord jaune, puis brun sombre (photo). Les larves de première génération s'introduisent à l'intérieur des bourgeons foliaires où elles s'alimentent. À la fin de leur développement, elles se fixent sur le calice.

Les larves des générations ultérieures se développent sur la face inférieure des jeunes feuilles, protégées dans une gouttelette de miellat. Plus tard, elles se fixent à la base du pétiole des fleurs, sur les jeunes rameaux ou sur les pédoncules des fruits, toujours largement recouvertes de miellat.

On observe 4 à 6 générations annuelles selon les régions et les conditions climatiques, la dernière génération apparaissant en septembre-octobre. Les insectes des deux premières générations sont peu nombreux. Ceux des générations 3 et 4 pullulent et occasionnent les dégâts les plus importants. Les dernières générations, à l'automne, sont dispersées sur tout le feuillage.

Moyens de lutte

- Favoriser la présence des auxiliaires au jardin comme les punaises prédatrices, les coccinelles ou les chrysopes.
- Lutter contre les fourmis qui protègent les psylles contre leurs ennemis naturels en mettant des bandes engluées autour des troncs.
- En traitement préforal, pulvériser une huile de pétrole.
- Pour les petits arbres, pulvériser au printemps avec du savon noir (30g/litre).

Les mois précédents ...

Jul 2015	La Teigne du Poireau
Aou 2015	L'Alternariose de la Carotte
Sep 2015	La Maladie des Taches pourpres du Fraisier
Oct 2015	La Schlérotiniose des Laitues
Nov 2015	La Tavelure du Pommier
Déc 2015	Le Balanin des Noisettes
Jan 2016	La Pyrale du Buis
Fév 2016	La Mouche du Navet
Mar 2016	La Hernie du Chou
Avr 2016	Le Puceron noir du Cerisier
Mai 2016	La Fumagine



Extraits de textes et photos : <http://www.jardiner-autrement.fr>

RELAIS, LES ANNONCES EN JUIN 2016

Vous souhaitez passer une annonce!

Elle peut concerner:

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, ...),
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, ...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Collectif
compost

Recherche des groupes d'habitants pour mettre en place du compostage partagé en pied d'immeuble.

Contacts: Jean-Yves BROCKERS 06 61 04 62 43, Pascale DAVID 06 10 14 84 74,
Philippe LUDWIG 06 43 57 52 07 ou Florian Franck-Neumann 06 21 11 47 83

FFP

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/>

Eurométropole
de Strasbourg
et Strasbourg

Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Jean-Louis AMANN, Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
jean-louis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

La Ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg proposent régulièrement des offres de service civique déposées sur le site Service civique et auxquelles vous pouvez postuler directement si elles vous intéressent: www.service-civique.gouv.fr/

Recherche un chargé-e d'études opérationnel-le sites et sols pollués
de l'Environnement et des services publics urbains / Environnement et transition énergétique
Date limite de dépôt des candidatures : 12/06/2016

Recherche un gestionnaire du patrimoine arboré - f/h
Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2016

Recherche un(e) CS Taille et soin des arbres
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2016

Propose un stage à la Direction des espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature /
Proposer le développement d'un outil de gestion des stocks
Date limite de dépôt des candidatures: 30/11/2016

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu

Communes de
l'Eurométropole
sauf Strasbourg

Aucune offre au 01/06/16

Plus d'infos sur : www.cap-territorial.fr

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-composter>

<http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/>