



LES INITIATIVES DES MEMBRES

Cette année, comptez les hirondelles de fenêtre !



L'Hirondelle de fenêtre a été désignée « Oiseau de l'année 2017 » par la LPO Grand Est, qui lance à cette occasion une grande enquête participative.

Lorrains, Alsaciens et Champardennais sont ainsi sollicités pour dénombrer les colonies et nids d'hirondelles de fenêtre, et ce entre le 15 juin et le 15 juillet. Des hirondelles nichent dans votre commune ou près de chez vous ?

A vous de jouer sur <http://alsace.lpo.fr> !

Photo et texte: LPO Alsace

DES NOUVELLES DU CLUB

Le Club compte 186 membres personnes morales (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS.

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

Parcs, squares ou pieds d'arbres, très sollicités, leur préservation dépend aussi de vous !

Les parcs les plus connus de la ville représentent environ 110ha, soit un bon quart des surfaces gérées par les équipes de jardiniers. Ce sont l'Orangerie, Pourtalès, les Contades ou la Citadelle et le Jardin des Deux Rives. Ajoutons les parcs de la Bergerie à Cronembourg, des Poteries à Koenigshoffen, du Kurgarten à Neudorf, le parc Imbs à la Montagne verte, le parc Schulmeister à la Meinau ou encore la plaine de jeux de HautePierre et ce sont 30 hectares de plus.

Pour en savoir plus: <http://www.strasbourg.eu>

Au programme de ce mois

Des nouvelles du Club	page 1
Les initiatives des membres	page 1
Infos, côté jardin	page 2
- Le jardin de Juin à début Juillet	
Infusions, décoctions, ...!	page 8
Le jardin au quotidien	page 9
Une maladie, un ravageur	page 10
- Le Botrytis des fraisiers	
Relais les annonces	page 11

Une démarche qui invite les Strasbourgeois à jardiner leur ville ! Vous pouvez découvrir les différents espaces à jardiner de Strasbourg: jardins familiaux, jardins partagés, potagers urbains collectifs, jardins d'école, lieux de cueillettes... <http://www.strasbourgcapousse.eu>




INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin de Juin à début Juillet

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

Les arbustes à feuilles (troène, ...) des haies taillées sont diminués en hauteur et en largeur grâce à une cisaille manuelle ou électrique et ceux à fleurs le sont après leur floraison avec un sécateur. Les déchets de tailles ramassés et broyés grossièrement à la tondeuse thermique servent de paillis au potager ou rejoignent l'aire de compostage.



Les rosiers sont en pleine floraison, mais avec plus ou moins d'odeurs! Comment les tailler afin de favoriser de nouvelles floraisons? Plus les feuilles sont proches des boutons floraux, plus le nombre de folioles diminue. Les rosiers ayant fleuri sont alors taillés juste après la première ou deuxième vraie feuille, souvent constituée de 5 folioles (voir photos).



Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes!

Les attaques des prédateurs sont très souvent stoppées par les auxiliaires (coccinelles, guêpes solitaires, forficules, ...). Au quotidien, le sécateur permet d'enlever les parties malades. Elles peuvent être déposées dans un autre espace du jardin comme le potager. Les feuilles malades sont ingurgitées par les lombrics terrestres, véritables aseptiseurs au service du jardinier!

En présence de chenilles défoliatrices (Cheimatobies, etc) en très grand nombre, le Bacille de Thuringe (BT) est efficace. Attention, le jardinier ne doit pulvériser que les plantes attaquées. Il ne doit pas le faire ailleurs, sinon il détruit les autres chenilles actrices de la biodiversité.

Les invasions de pucerons peuvent être limitées grâce à des pulvérisations d'infusions de mélisse ou de sauge (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation sans dilution), ou à des macérations froides de feuilles de rhubarbe (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation sans dilution). Le jardinier peut aussi utiliser du savon noir. Pour prévenir l'attaque de maladies et une fois les différentes floraisons passées, le jardinier peut pulvériser les arbres avec une décoction de préle (100g de plantes fraîches/litre ou 30g de plantes sèches/litre d'eau et pulvérisation avec une dilution à 20%).



Ce n'est pas très bon du côté de certains arbres fruitiers à noyaux (cerisiers, pruniers) en raison des très fortes gelées matinales d'avril! D'autres protégés ont de belles récoltes à venir.



Nombreux sont les pommiers couverts de fruits au stade phénologique "petits fruits". Il faudra attendre la chute physiologique de ce mois de juin avant d'enlever les excès par éclaircissage. Il suffit de couper la petite pomme en 2 grâce à un couteau bien affûté.



Les groseilliers ou les cassisiers (photo) déploient de longues grappes. Des tontes de gazon sont déposées aux pieds (1 à 2 cm d'épaisseur) pour reconstituer la litière.



Côté pieds de myrtilles sauvages ou bleuets, des apports épais (5 à 10 cm) d'épines ou d'aiguilles de conifères renforcent l'acidité du sol indispensable à ces plantes acidophiles.

Les ronces, avec ou sans épines, finissent leur floraison. Les pousses qui se couvriront de fruits en 2018 sont en plein développement. Le jardinier veille à ne pas les endommager avec la tondeuse; il les guide et les attache provisoirement sur les fils ou les piquets.



Les framboisiers remontants produisent déjà et les framboisiers non remontants (photo) sont en fin de floraison en ce début de mois; les cueillettes commenceront fin juin. Des apports de broyat, de feuilles ou de tontes de gazon desséchées sont nécessaires aux pieds pour prévenir la sécheresse estivale. Les coups de chaleur de 2016 ont été redoutables sur les baies!

Les fraisiers non remontants sont en production; les fruits sont souvent gros mais en faible quantité en raison des gelées noires d'avril. Le jardinier peut rajouter aussi des aiguilles de pin ou de sapin pour limiter les attaques des limaces et pour que les fruits soient propres.



Quelques conseils pour protéger son verger! Le jardinier peut poursuivre l'installation des bandes engluées à mi-hauteur autour des troncs ou à la base des premières charpentières si le tronc est couvert de lierre. Elles piégeront les fourmis, éleveuses de pucerons.

En présence de chenilles défoliatrices (Cheimatobies, ...) ou d'invasions de pucerons, le jardinier peut se référer aux alternatives aux pesticides du paragraphe "Arbres, arbustes et arbrisseaux".

Pour prévenir l'attaque de maladies (tavelure, oidium, cylindrosporiose, ...) et une fois les différentes floraisons passées, le jardinier peut pulvériser les arbres avec une décoction de prêle (100g de plantes fraîches/litre ou 30g de plantes sèches/litre d'eau et pulvérisation avec une dilution à 20%).

Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.



- L'espace « Ratatouille » : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
- L'espace « Plat gros volumes » : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.
- L'espace "Soupe de courges": toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades et les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire de Juin à début Juillet ?


Espace "Potée 2017"

Ce mois, les variétés tardives de carottes sont encore semées en semis clairs (30 cm au maximum entre les rangs). Le choix peut se porter sur des carottes fourragères comme la carotte jaune du Doubs ou la carotte blanche à col vert. L'éclaircissage des semis précédents se poursuit en laissant un plant tous les 5 à 10 cm. Ces déchets odorants sont laissés sur place ou sont déposés aux pieds des choux ce qui limite les aleurodes (petits moucheron blancs). Le jardinier peut déposer entre les rangs de très fines couches de tontes de gazon.



Les semis de panais sont éclaircis sur le rang à 10 cm puis de 15 à 20 cm. Les déchets sont laissés sur place et jouent le rôle de paillis.

Les premiers poireaux et les choux (chou-fleur, brocoli, chou rouge, vert, de Milan, cabus, ...) issus de la pépinière ou achetés sont repiqués en respectant les distances de plantation. Les choux-raves, choux-navets, les choux à feuilles ou de Bruxelles peuvent être encore semés en juin.



entre les rangs. Les premières sont mangées dans quelques semaines. Des céleris-raves peuvent encore être repiqués ce mois.



Les topinambours (photo) ou les crosnes commencent à prendre du volume, surtout les premiers. Attention les topinambours sont des plantes invasives. Les campagnols ou rats-taupiers les adorent!



Les plants de concombres ont été repiqués en mai à la base d'un grillage; ils peuvent l'être encore tout ce mois de juin.

Pour boucher les trous!

Le jardinier peut occuper les espaces libres grâce à des salades; il peut aussi le faire avec le semis de navets blancs ou de Nancy ou de betteraves rouges qu'il récoltera jeunes et petits!



Quelques conseils pour protéger l'espace potée!

En présence d'un feutrage blanc sur les feuilles de concombre (oïdium), le jardinier peut pulvériser de l'eau additionnée de lait ou de petit-lait (proportion moitié-moitié).

Pour limiter les invasions d'aleurodes sur les choux, les infusions de mélisse ou de menthe ou une macération de 24h de feuilles de rhubarbe sont efficaces. Une pulvérisation de savon noir l'est aussi. Les choux sont aussi attaqués par les chenilles des Piérides (papillon blanc avec une tache noire sur les ailes). En cas de forte infestation, une pulvérisation de Bacille de Thuringe est conseillé ... et uniquement sur les choux!

Pour lutter contre les mouches ou les papillons prédateurs des carottes ou des poireaux, les filets anti-insectes sont les plus efficaces.

Le jardinier peut prévenir les attaques de champignons avec des pulvérisations d'une décoction de prêle (avec une dilution à 20%).

Enfin, l'arrosage (1 volume d'extrait fermenté pour 4 d'eau) ou la pulvérisation (1 volume pour 19 d'eau) d'un extrait fermenté de consoude ou d'ortie (ou mélangés) renforce et stimule les plantes.

En résumé pour l'espace "Potée "

- Semer en pleine terre des carottes tardives et dans les espaces libres des betteraves-rouges et des navets blancs ou de Nancy.
- Repiquer les différents choux et les poireaux, et les concombres, et les salades dans les espaces libres.
- Semer en pépinière pour être repiqués ensuite en pleine terre dans cet espace: chou cabus d'été ou d'automne, chou de Milan, chou-fleur précoce et différentes salades (laitues ou chicorées) pour occuper les espaces libres.

Espace "Plat gros volumes 2017"

Les **haricots nains** profitent des bonnes conditions climatiques depuis mai à ce début juin. Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 1er août. L'épandage de cendre de bois entre les rangs est bénéfique en raison



des apports de potasse. Ne pas oublier de butter les haricots verts!

S'il ne l'a pas encore fait, le jardinier ayant semé **des haricots à rames** doit enfoncer des piquets longs de 2 à 3 m. 2 à 3 mois sont nécessaires entre semis et récoltes. Juin est encore propice aux semis.



Les **petits-pois, à rames ou nains, et les fèves** se développent rapidement. Ils sont en fleurs et les premières gousses ont été cueillies.



Les **pommes de terre** se développent très bien grâce aux fortes chaleurs et aux épisodes pluvieux.

Les parties vides de l'espace «Plat gros volume» peuvent être semées **de radis** ou repiquées **de salades**.

Quelques conseils pour protéger l'espace Potée!

Les attaques de pucerons sur les fèves ou les haricots sont limitées grâce à la pulvérisation d'infusion de mélisse ou de menthe, de macération de 24 h de feuilles de rhubarbe ou de savon noir.

Les doryphores sont ramassés ou écrasés à la main!

En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"

- Semer en pleine terre les haricots nains ou à rames.
- Semer en pépinière les laitues de printemps pour être repiquées ensuite en pleine terre dans cet espace; elles occupent les espaces libres.

Espace "Ratatouille 2017"

L'ail, l'oignon et l'échalote sont vigoureuses et en bonne santé en ce début juin grâce aux grosses chaleurs. Le sol doit être laissé nu sans paillis pour éviter toute pourriture des bulbes.



Sur le reste de l'espace Ratatouille, les tomates, les aubergines, les poivrons et les piments sont presque tous plantés en ce début de mois! Un arrosage toutes les semaines avec un extrait fermenté d'ortie ou de consoude (dilution à 20%), seuls ou en mélange, donne un coup de fouet.



Les courgettes non coureuses plantées tous les mètres donnent leurs premières fleurs. Les aubergines commencent à fleurir. Le jardinier ne doit pas oublier de tuteurer les poivrons et les piments; ces "arbustes fruitiers" sont fragiles et peuvent casser sous le poids de leurs fruits.

Aux pieds des courgettes, des tomates, des poivrons ou des aubergines, il faut compléter le paillage avec les déchets verts du moment (tontes, déchiquetât de

tailles d'arbustes, ...). Les parties libres servent à repiquer les salades.

La sauge, le romarin ou le thym bouturé au printemps commencent à prendre du volume. Le jardinier poursuit le semis d'autres plantes aromatiques : persil frisé ou plat, cerfeuil, coriandre, aneth, basilic.

Quelques conseils pour protéger l'espace Ratatouille!

Le jardinier protège des limaces les jeunes plants de courgettes en mettant un pot percé autour et dépassant de 3 à 5 cm. 3 à 5 granules d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur. Pour les poivrons, la technique du "pot percé" peut être utilisée pour lutter contre les limaces très friandes de leurs feuilles.

Pour prévenir l'attaque de Mildiou le jardinier peut pulvériser les tomates tous les 15 jours avec une décoction de prêle (dilution à 20%), avec des extraits fermentés de consoude et d'ortie (1 volume d'extraits pour 19 d'eau).

En résumé pour l'espace "Ratatouille"

- Planter les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments et les courgettes.
- Planter en bordure les plantes aromatiques
- Semer en godet des courgettes pour remplacer les premières.

Espace "Soupe de courges 2017"



Concernant l'espace "Soupe de courges" qui répond aux mêmes exigences que l'espace "Ratatouille", le jardinier repique ce mois les différentes espèces de courge, de potiron ou de citrouille en respectant les distances de plantations (de 1 à 3 m selon les variétés).


Quelques conseils pour protéger l'espace Soupe de courges!



Le jardinier protège les jeunes plants des limaces avec la technique du "pot percé" comme dans l'espace Ratatouille.

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"

- Planter tous les types de courges.



Les massifs de plantes

Le jardinier transplante en pleine terre différentes plantes horticoles ou sauvages: achillée, capucine, cléome, cosmos, lavatère, lin, œillet d'Inde, pétunia, reine marquerite, souci, ... Les fleurs sont aussi prévues au potager !



La pelouse

Avec les épisodes pluvieux et chauds, les graminées poussent rapidement. Une tonte à une hauteur supérieure à 60 mm est préférable. En dessous, l'herbe pousse encore plus! Ces déchets très azotés sont déposés aux pieds des arbustes (couches de 3 à 5 cm). Ils sont aussi étendus en fines couches sur le potager (1 cm). Si la pelouse présente de

nombreux espaces sans herbes, le jardinier peut acheter de la «semence spéciale regarnissement» ou ne pas tondre à proximité pour laisser monter les graminées en graines. La future «pluie» de semences sera très efficace car les graines sont issues de variétés adaptées au type de sol et sont surtout gratuites !

L'aire de compostage

Le compostage en tas ou en bac permet de valoriser une partie des déchets verts importants à cette période de l'année.

Pour favoriser la transformation en humus, il est important de bien brasser les déchets en surface du

bac, à la fourche et 1 à 2 fois par semaine. Les déchets de «3 mois d'âge» peuvent être épandus dans l'espace Rataouille ou celui Soupe de courges. Ils peuvent être mis au fond du trou pour la plantation des courges.

Infusions, décoctions, ... !

Tout le long des paragraphes, le jardinier retrouve des conseils permettant de se passer de pesticides (texte en rouge). Sont privilégiés des solutions simples et souvent gratuites: infusions, décoctions, extraits

fermentés... Bien entendu, le jardinier peut faire le choix d'acheter les préparations prêtes à l'emploi et vendues chez les spécialistes membres du Club.

Infusion

Faire frémir de l'eau de pluie, éteindre puis plonger les plantes coupées (100g/l). Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Extrait fermenté

Plonger les plantes (1000g/10l) dans un bidon rempli d'eau de pluie à 15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent et sur plusieurs jours. La fermentation va rapidement débuter. Une fois finie, filtrer avec précaution puis mettre dans des bidons qui seront entreposés au frais et à l'ombre (cave, ...). Utiliser dilué sur 6 mois. En règle générale pour la dilution: un verre d'extrait + 4 d'eau pour l'arrosage, et un d'extrait + 19 d'eau pour la pulvérisation.

Macération non fermentée

Faire macérer les plantes coupées (100g/l), 24 h, dans de l'eau de pluie et à 15/20°C. Filtrer. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Décoction

Plonger les plantes coupées (100g/l) dans de l'eau puis faire frémir l'eau de pluie pendant 20 mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Autres infos:

- Si le jardinier utilise des plantes sèches, la quantité est de 30g/l.
- Les plantes ne sont pas mélangées avant, mais après "la cuisine".
- La pulvérisation est faite le soir.

Moustique tigre et maladies vectorielles !

Bien que nuisants, tous les moustiques ne transmettent pas de maladies. *Aedes albopictus*, moustique d'origine tropicale, également appelé « moustique tigre », est le vecteur potentiel de trois maladies virales : la dengue, le chikungunya et le zika.

Une surveillance particulière de ce moustique a été mise en place en France métropolitaine par le Ministère de la santé qui a élaboré en 2006 un plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue.

Ce plan est mis à jour annuellement, il décrit les mesures de surveillance, de lutte contre la prolifération du moustique et de protection des personnes. Il classe le risque en 6 niveaux (0 à 5).

Le département du Bas-Rhin est classé au niveau 1!




Recommandation aux particuliers!

Il est très important de supprimer les eaux stagnantes qui permettent la reproduction du moustique, à l'intérieur et surtout autour de son domicile :

- enlever les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable,
- changer l'eau des vases plusieurs fois par semaine,
- vérifier le bon écoulement des gouttières,
- mettre à l'abri de la pluie ou supprimer les pneus usagés et tout autre objet pouvant se remplir d'eau, etc.

En Alsace, le moustique *aedes albopictus* fait l'objet d'une surveillance depuis 2010. Il est implanté dans le Bas-Rhin depuis 2015 et fait l'objet d'une surveillance renforcée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Texte, photo et Plus d'infos sur: <http://www.eschau.fr/blog/2017/05/24/moustique-tigre-et-maladies-vectorielles/>



Le jardin au quotidien !

Même si le jardinier ne croît pas au calendrier lunaire, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de différents travaux au jardin.

En Juin 2017 ...

Jardiner avec la lune, c'est bien! Mais il faut privilégier les conditions extérieures: sol ressuyé, conditions climatiques adaptées et ... l'envie du jardinier!

1	Jour fruit: Plantation sous abri (ou pas) des aubergines, des poivrons et des tomates, et plantation des courgettes, courges et autres cucurbitacées.	Lune descendante	22	Jour racine: Semis de carottes, choux-raves, navets, radis.	Lune descendante
2			23	Périgée: Ne rien faire	
3	Jour racine: Plantation des céleris.		24	Jour fleur: Plantation de choux-fleurs, choux-brocolis, choux Romanesco.	
4	Ne pas oublier en lune descendante: tonte de la pelouse, travail du sol, paillage et fertilisation organique.		25		
5			26	Jour feuille: Plantation de choux feuilles, bettes, choux de Chine.	
6	Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs, des chou-fleur, brocoli, Romanesco, ... Plantation des vivaces, annuelles à fleurs (géranium, ...).		27	Noeud lunaire: Ne rien faire	
7			28	Jour fruit: Plantation des aubergines, des poivrons et des tomates, et plantation des courgettes, courges et autres cucurbitacées.	
8	Jour feuille: Plantation des choux à feuilles et des salades.		29		
9	Apogée: Ne rien faire		30	Jour racine: Plantation des betteraves rouges produits en godets, céleris.	
10	Jour fruit: Plantation des courgettes, courges et autres cucurbitacées				
11	Jour fruit: Semis des courgettes, courges et autres cucurbitacées, haricots nains ou rames.	Lune ascendante	... puis début Juillet !		
12			01	Jour racine: Plantation des betteraves rouges produits en godets, céleris.	Lune descendante
13	Jour racine: Semis de betteraves rouges ou de différentes couleurs, carottes, choux-raves, navets, radis.		02		
14			03	Jour fleur: Plantation de choux-fleurs, choux-brocolis, choux Romanesco.	
15	Noeud lunaire: Ne rien faire		04		
16	Jour fleur: Semis en pépinières de choux-fleurs, choux-brocolis, choux Romanesco,.		05	Jour feuille: Plantation de choux feuilles, bettes, choux de Chine, salades (laitue ou chicorée).	
17			06	En Lune descendante, ne pas oublier tonte de la pelouse, travail du sol, son paillage et sa fertilisation organique.	
18	Jour feuille: Semis de salades en pépinières (laitue ou chicorée), bettes (blettes ou poirées).		07		
19			08	Jour fruit: Semis de courgettes, haricots nains.	
20			09		
21			Jour fruit: Semis de haricots nains ou rames.	10	

Encore plus simple !

- En Lune descendante: tous les travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de multiplication avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe (tronçonnage, élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique.
- En Lune ascendante: tous les travaux de semis.

UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

Le Botrytis des Fraisiers

Avant que la pourriture soit visible, les jeunes fruits brunissent et se dessèchent. Si les conditions d'humidité et de température sont favorables, ils se couvrent ensuite de fructifications grises caractéristiques du champignon.

Pour les attaques qui interviennent à la maturité des fruits, ces derniers deviennent ternes, puis, en 24 à 48 heures, ils se couvrent de fructifications, d'abord blanc-grisâtre puis grises.

Les conditions optimales du champignon sont une humidité supérieure à 90% pendant 16h, avec une température située entre 14 et 18 °C. Dans ces conditions, le développement très rapide du champignon rend son contrôle très difficile. Le champignon peut aussi s'attaquer aux feuilles ou aux fleurs.

Biologie

Le nom *Botrytis cinerea* correspond à la forme asexuée du champignon. La forme sexuée, appelée *Botryotinia fuckeliana*, est très rarement observée dans la nature et n'est obtenue qu'en conditions contrôlées au laboratoire.

Ce parasite est un champignon opportuniste capable de coloniser des tissus sains, déjà infectés ou morts. Il s'attaque à une très grande variété de plantes et provoque des symptômes différents selon les organes ou les plantes contaminées.



Moyens de lutte

- Limiter les apports d'azote et les excès d'eau,
- Supprimer les fruits atteints aussi rapidement que possible pour limiter la dissémination,
- Pailler les rangs, pour éviter les éclaboussures sur les fruits (associez le paillage à un bon rythme d'arrosage pour limiter les risques d'excès d'humidité en surface, en arrosant le matin par exemple). Attention, le paillage maintenu trop humide peut favoriser le développement des limaces,
- Lutter contre les guêpes qui peuvent blesser les fruits et favoriser l'entrée du champignon dans le fruit (piège à guêpes à proximité des plantes),
- Limiter la densité des plantations pour améliorer la circulation de l'air entre les plants,
- Arroser directement au pied des plantes pour éviter de mouiller le feuillage.

Les mois précédents ...

Jun 2016	La Psylle du Poirier
Jul 2016	Les Mineuses
Aou 2016	La Cochenille du Fusain
Sep 2016	L'Entomosporiose du Poirier
Oct 2016	La Puceron lanigère du Pommier
Nov 2016	La Puceron noir du Dahlia
Déc 2016	La Moniliose des arbres fruitiers
Jan 2017	La Mouche du semis
Fév 2017	La Rouille du Prunier
Mar 2017	Le Botrytis de l'Oignon
Avr 2017	Le Tarsonème du Fraisier
Mai 2017	Les Chancres



Extraits de textes et photos : <http://www.jardiner-autrement.fr>

RELAIS, LES ANNONCES EN JUIN 2017

Vous souhaitez passer une annonce!

Elle peut concerner:

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, ...),
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, ...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

FFP

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/>

La Ville et
l'Eurométropole
de Strasbourg

Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Jean-Louis AMANN, Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
jean-louis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3ème / Strasbourg et EMS -
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017

Plus d'infos sur :

Groupe d'Étude
et de Protection
des mammifères
d'Alsace

Le GEPMA, association régionale à but non lucratif, mène depuis plusieurs années des actions de sensibilisations auprès du grand public pour échanger autour des mammifères, et plus largement de la biodiversité alsacienne.

Le GEPMA vous propose, via la mise en place de stands et/ou d'animations scolaires, de réaliser une ou plusieurs actions visant à sensibiliser les habitants de votre commune à leur environnement, le tout dans une ambiance conviviale. De nombreux outils pédagogiques ont été créés dans ce but et sont adaptés en fonction du public.

Vous êtes intéressés pour accueillir un stand ou faire profiter vos écoles d'animations scolaires, et vous voulez obtenir plus d'informations ?

Contactez Julie Roux par mail j.roux@gepma.org ou par téléphone au 03 88 22 53 51

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-composter>

<http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/>