



DES NOUVELLES DU CLUB

Le Club compte 186 membres personnes morales (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS.

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

LES INITIATIVES DES MEMBRES

Faites vos produits ménagers vous-mêmes !

Avec les produits naturels, quelques ingrédients suffisent pour réaliser des recettes simples et efficaces pour tous les besoins ménagers des jardiniers et ceci tout en préservant l'environnement !

Fabriquer ses produits ménagers, c'est :

- Bon pour vos finances : Vous faites des économies en fabriquant vos produits avec des ingrédients peu chers.
- Bon pour l'environnement : Vous utilisez des produits biodégradables et durables. Ils respectent l'environnement et diminuent la quantité de déchets produits.
- Bon pour la santé : Vous utilisez des produits respectueux de votre santé et de celle de vos proches.
- Bon pour vous : Vous êtes autonome dans le choix de vos ingrédients et agissez en faveur du développement durable.



La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg proposent disponible un guide en téléchargement sur le site <http://www.strasbourg.eu/>

Photo et texte: Ville et Eurométropole de Strasbourg

Au programme de ce mois

Des nouvelles du Club	page 1
Les initiatives des membres	page 1
Infos, côté jardin	page 2
- Le jardin de Mai à début juin	
Infusions, décoctions, ...!	page 8
Le jardin au quotidien	page 9
Une maladie, un ravageur	page 10
- Les Chancres	
Relais les annonces	page 11



INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin de Mai à début Juin

Les arbres, arbustes et

arbrisseaux

Les arbustes ayant fleuri en avril achèvent leur floraison; d'autres espèces la poursuivront jusqu'en juin.

C'est le moment de tailler les **arbustes à floraison printanière**! Cet exercice préféré ou détesté des jardiniers permet d'engendrer une floraison abondante d'année en année tout en gardant la forme choisie pour les végétaux.

Comment faire ? Il faut retirer toutes les branches sèches, celles qui se croisent et les branches malades. Le déchet de taille peut être broyé au broyeur ou déchiqueté à la tondeuse thermique. Prioritairement, le broyat est déposé comme paillis dans les parties nues du potager ou, s'il est en excès, rejoint le tas de compost en mélange avec les tontes de gazon.

Attention, un oiseau peut avoir installé son nid, il est préférable alors de tailler les arbustes qu'à partir de fin juillet.

Quelques exemples pour des arbustes horticoles:

- **Forsythia**: Cet arbuste très commun des jardins a une floraison abondante sur bois de 1 à 2 ans. S'il est conduit librement en touffe, la taille se limite les premières années à un nettoyage en supprimant les grandes tiges malingres ou mal placées. L'arbuste est ainsi bien aéré et son développement est harmonieux. Pour les années qui suivent, il suffit de tailler les extrémités des rameaux tous les 2 ans afin de provoquer des ramifications latérales et de supprimer les vieilles branches. En éliminant ces dernières, le jardinier évite le dégarnissement de la base. Si le Forsythia est conduit en haie taillée, il est important de le tailler en juillet. Attention, la floraison est moins abondante qu'en forme libre.
- **Cognassier du Japon** : Conserver les branches de 1 et de 2 ans sans les raccourcir. Tous les ans, couper un tiers des rameaux âgés, malingres ou gênant.



- **Grosseillers à fleurs** : Couper les branches les plus âgées de façon à favoriser l'émission de nouveaux rejets. Tailler celles qui retombent, juste au-dessus d'une pousse verticale bien vigoureuse.
- **Lilas** : Bien que la taille des lilas soit controversée, tailler juste au-dessus d'un rameau latéral qui joue le rôle de tire-sève.
- **Spirée de printemps** (photo) : Ne pas tailler ces arbustes en boule et ne pas raccourcir les rameaux. Conserver les branches de 1 ou 2 ans. Couper les branches âgées, sèches ou disgracieuses.
- **Weigelia** : Conserver les branches de 1 ou 2 ans sans les raccourcir. Toutefois, couper à ras quelques branches parmi celles qui sont les plus âgées.

- **Kolkwitzia** : Quand l'arbuste est jeune, couper les branches les plus âgées de façon à favoriser l'émission des rejets. Plusieurs années après, comme les branches arquées vont générer des pousses florifères, tailler le bois juste au-dessus de ces rameaux vigoureux.

- **Cytise** : Éliminer les rameaux secs, les branches qui vous paraissent les plus gênantes, ainsi que celles qui se croisent.
- **Boule de neige** : Conduit en buisson, tailler cet arbuste régulièrement chaque année à la manière d'un forsythia.
- **Deutzia** : Couper une partie des branches parmi les plus vieilles pour favoriser l'émission de nouvelles. Couper aussi celles qui s'arquent juste au-dessus d'un rameau latéral vigoureux.

Côté arbustes des milieux acides:

- **Azalée** : Rabattre les tiges au-dessus d'un rameau latéral qui va servir de tire-sève.
- **Rhododendron** : Pour densifier la floraison, tailler juste au-dessus d'un rameau latéral qui sert de tire-sève.

Qu'écrire en ce début de mois de mai? C'est la catastrophe dans de nombreux vergers alsaciens suite aux températures matinales très basses de fin avril. Pourtant, tout avait bien commencé avec une floraison optimale et des pollinisateurs au rendez-vous. Le changement climatique provoque des situations instables qui engendrent des "trop" à de mauvais moments: trop chaud, trop froid ou trop humide. C'est au galop que le trop s'installe! Nombreuses sont les cerises ou les prunes (mirabelles, quetsches, Reine-claude, ...) déjà noires par plusieurs matinées de gel. La nouaison (stade phénologique avant celui de petit fruit) est très irrégulière chez les pommiers ou les poiriers. Ce risque est aussi important sur les cognassiers en



pleine floraison. Le jardinier n'a plus qu'à attendre plusieurs jours pour observer les dégâts. En ville, le jardinier peut être plus optimiste car les bâtiments peuvent avoir protégé les arbres.

Côte petits fruits, les dégâts sont peu importants sur les framboisiers ou les mûres car ils étaient encore en boutons lors des gelées matinales. Les cannes des framboisiers, desséchées ou malades, sont éliminées. Les nouvelles pousses sont nombreuses et vigoureuses aux pieds. Celles situées hors du rang sont éliminées à la houe et laissées sur place. Les apports de paillis (tontes de pelouse desséchées, broyat de branches, feuilles mortes de l'automne dernier, ...) ne doivent pas blesser celles poussant sur le rang; ces dernières vont engendrer les futures productions de fruits ... en 2018.



Les grappes de cassis ou de groseilles sont bien fécondées. Il faut espérer que le gel n'ait pas détruit une partie des fruits. Les pucerons jaunes peuvent

certaines jeunes feuilles. Des applications d'extraits de plantes (sauge, mélisse, rhubarbe, ...) ou de savon noir limitent leur invasion.

Les fruits des casseillers ou des groseilliers à maquereau sont nombreux.

Les fraisiers sont en pleine floraison surtout les variétés non remontantes.



Chez certains jardiniers, toutes les fraises en formation sont brunes par le gel. Il faudra attendre la production des fraisiers remontants dits "des 4 saisons". Il faut penser à renforcer les «paillis piquants» en apportant des aiguilles de pin ou de sapin; ces dernières limitent les invasions de limaces, apportent une légère acidité et protègent les fruits de salissures. Ce paillage est plus efficace que celui composé de paille surtout si cette dernière est "chargée" en fongicides. Mieux vaut utiliser de paille issue de l'agriculture biologique.

Quelques conseils pour protéger son verger!

Le jardinier peut poursuivre l'installation des bandes engluées à mi-hauteur autour des troncs ou à la base des premières charpentières si le tronc est couvert de lierre. Elles piégeront les fourmis, éleveuses de pucerons.

En présence de chenilles défoliatrices (Cheimatobies, etc), le Bacille de Thuringe (BT) est efficace. Sur les jeunes arbres, leur destruction peut être manuelle. Attention, le jardinier ne doit pulvériser que les plantes attaquées. Il ne doit pas le faire ailleurs, sinon il détruit les autres chenilles actrices de la biodiversité.

Les invasions de pucerons peuvent être limitées grâce à des pulvérisations d'infusions de mélisse ou de sauge (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation à 100%), ou à des macérations froides de feuilles de rhubarbe (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation à 100%). Le jardinier peut aussi utiliser le fameux savon noir.

Pour prévenir l'attaque de maladies et une fois les différentes floraisons passées, le jardinier peut pulvériser les arbres avec une décoction de prêle (100g de plantes fraîches/litre ou 30g de plantes sèches/litre d'eau et pulvérisation avec une dilution à 20%).

Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.



- L'espace « Ratatouille » : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
- L'espace « Plat gros volumes » : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.
- L'espace "Soupe de courges" : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades et les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire de Mai à début Juin ?

Si le sol est argileux, il est trop tard pour bêcher. Si le sol est limoneux ou sableux, le décompactage avec une grelinette ou une fourche-bêche est toujours possible. Avant un semis, le décompactage est fait 2 à 3 semaines avant, ainsi que le déshabillage du sol de ses différents types de paillis. Son réchauffement est nécessaire. Attention, les travaux sont à faire si le sol n'est pas gorgé d'eau!

Espace "Potée 2017"

Les carottes tardives sont semées jusqu'en juin en semis clairs (30 cm au maximum entre les rangs). Le jardinier dépose des tontes de gazon en très fine couche sur le rang la première fois, puis ensuite entre les rangs. L'éclaircissage commence en mai sur les premiers semis de carottes précoces de mars/avril et ceci en laissant un plant tous les 5 à 10 cm. Les déchets d'éclaircissage sont laissés sur le rang.

Les semis de panais semés en avril commencent à lever. Ils seront éclaircis de 15 à 20 cm sur le rang. Le jardinier peut encore en semer en mai.

Ce début de mois, le jardinier poursuit le repiquage des choux achetés en motte (Chou-fleur, brocoli, chou rouge, vert, de Milan, cabus, Romanesco ...) et ceci en respectant les distances de plantation (choux-raves: 30 cm, choux pommées: 50 cm, ...). La plantation peut se faire sur un paillis odorant (taille de sauge, ...), ce qui limite la



prolifération des aleurodes (moucheron blancs qui s'envolent lorsqu'on frappe les feuilles). Ces insectes peuvent être combattus grâce à la pulvérisation d'infusions de mélisse, de lavande ou de sauge.

Courant mai et jusqu'en juin et une fois la terre réchauffée, le jardinier repique les céleris-raves à plus de 30 cm sur et entre les rangs. Une terre enrichie en compost mûr est nécessaire pour obtenir de grosses racines car ce légume est très gourmand en nutriments. Un paillage est déposé en surface pour optimiser les pluies ou les arrosages. Avec des inter-rangs plus larges, des poireaux peuvent être repiqués ou pourront l'être en juin ou en juillet. Cette association de légumes est favorable. Le jardinier peut aussi optimiser la place en repiquant des salades ou en semant des radis.

Les topinambours ou les crosnes sont sortis de terre après les froids de fin avril et se développent rapidement.

Les plants de concombres encore en godets sont repiqués fin mai tous les 1 m près du grillage et dans une terre riche en matière organique. Le palissage des concombres favorise leur développement et limite les attaques de l'oïdium. Les fruits ne traînent pas sur le sol, et sont uniformément verts et plus droits. Il est encore possible d'en semer en mai et en juin directement en pleine terre.

A chaque semis de carottes, il est conseillé d'ajouter une pincée de graines de salades et 3 de radis. A partir de 3 semaines, le jardinier a de la salade à repiquer et des radis à manger.

Penser aussi à semer dans les espaces libres des navets blancs ou de Nancy, ou des betteraves rouges ou d'autres couleurs et ceci tous les 10 jours! Récoltés petits, ces légumes sont savoureux crus. Jeunes, ils sont rarement attaqués par les prédateurs.

Pour préparer les plantations destinées aux récoltes d'hiver, les différents types de choux, les salades et les poireaux d'automne et d'hiver sont semés en pépinière; ils seront repiqués en juillet et en août.

En résumé pour l'espace "Potée "

- Semer en pleine terre des carottes tardives, des panais, des betteraves-rouges et des navets blancs ou de Nancy.
- Repiquer les différents choux et les poireaux précoces, et à partir du 15 mai les céleris et les concombres.
- Semer en pépinière pour être repiqués ensuite en pleine terre dans cet espace: chou cabus d'été ou d'automne, chou de Milan, poireau d'été, chou-fleur précoce et différents types de laitue pour occuper les espaces libres.



Espace "Plat gros volumes 2017"

Début mai, le jardinier poursuit la plantation des pommes de terre en creusant à la houe une tranchée de 15 cm de profondeur. Un tubercule est déposé tous les 30 cm. Ceux plantés mi-avril pointent leurs feuilles. Certaines ont été gelées fin avril, ce n'est pas grave; d'autres tiges vont poussées.

Les haricots nains demandent un sol bien réchauffé pour germer; le jardinier doit attendre le 15 mai pour être plus serein. 60 jours sont nécessaires entre semis et récoltes. Ainsi, semés mi-mai, la récolte est programmée du 15 au 20 juillet. Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août.

En installant plusieurs piquets de 2,50 à 3 m (tipi, épouvantail inversé, ...), le jardinier peut semer en poquet des haricots à rames. 2 à 3 mois sont nécessaires avant leur récolte.

En attendant de butter les pommes de terre ou les haricots verts, un paillis de gazon (1 cm) est déposé



en surface. Une fois ces légumes buttés, les apports de déchets verts fins sont à poursuivre en fine couche entre les rangs.

Les petits-pois, rames ou nains, et les fèves (photo) se développent rapidement. Début mai, il est encore possible de semer des petits-pois avec un risque que début juillet les températures soient importantes comme en 2016. Ces légumes aiment des situations plus fraîches à la différence des haricots.

Les pucerons noirs des fèves sont combattus avec des pulvérisations d'infusions de mélisse, de sauge ou de lavande. Le jardinier peut aussi utiliser du savon noir (30g par litre d'eau) ou pincer simplement les feuilles atteintes.

Les parties vides de l'espace « Plat gros volume » peuvent être consacrées aux légumes à pousse rapide comme les salades ou les radis.

Si le jardinier a fait le choix en mars de semer un engrais vert comme la moutarde. Il fauche au fur et à mesure les parties dont il a besoin pour planter ou semer. La fauche réduite à la cisaille est laissée sur place, sert de paillis pour d'autres légumes ou rejoint le tas de compost.



En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"

- Semer en pleine terre les petits-pois et, à partir du 15 mai les haricots nains ou à rames.
- Planter les pommes de terre.
- Semer en pépinière les laitues de printemps pour être repiquées ensuite en pleine terre dans cet espace; elles occupent les espaces libres.

Espace "Ratatouille 2017"



L'ail, l'oignon et l'échalote sont en feuilles. Le sol doit être laissé nu pour éviter tout risque de pourriture des bulbes. Toutefois, quelques vivaces à fleurs ou plantes aromatiques peuvent être laissées pour favoriser la biodiversité. Le gel ne semble avoir fait aucun dégât!

A partir du 15 mai, le jardinier repique hors abri toutes les courgettes, tomates, poivrons, aubergines ou piments qu'il a semé il y a plusieurs semaines ou qu'il vient d'acheter en godet ou en motte. Quelques soient ces plantes, il creuse un trou large et profond d'un fer de bêche qu'il remplit de compost décomposé mélangé à de la terre.

Les aubergines, les poivrons et les piments (photo) sont repiqués à 0,60/0,80m sur et entre les rangs. Ces légumes-fruits sont tutorés. Cette précaution évite toutes les casses, car les fruits mûrs sont très lourds.



Les pieds de tomates sont plantés avec précaution la motte à plat afin de favoriser l'émission de nouvelles racines sur la tige enterrée. Les distances de plantation sont de 0,60/0,80m sur et entre les rangs. Un tuteur droit, torsadé (queue de cochon)

ou un simple fil convient à ces légumes fruits très "poussants". Pour prévenir l'attaque de Mildiou le jardinier peut pulvériser les tomates avec une décoction de prêle (100g de plantes fraîches/litre ou 30g de plantes sèches/litre d'eau et pulvérisation à 20%).

Les courgettes non coureuses issues des semis en godets sont plantées tous les 1 m sur et entre les rangs.

Une fois tous les légumes-fruits repiqués, le jardinier couvre le sol d'un paillis pour couvrir les parties nues: dépôt de tontes de gazon en premier puis du broyat ou déchiquetât des tailles d'arbustes. Cette zone libre peut aussi être repiquée de salades. En mai puis en juin, des courgettes sont semées en godet pour des plantations en juin et juillet.

La sauge, le romarin ou le thym bouturés en mars ou avril se développent bien à condition qu'ils soient bien arrosés. Les plantes aromatiques achetées en godet peuvent être plantées jusqu'en mai. Le jardinier poursuit le semis d'autres plantes aromatiques: persil frisé ou plat, cerfeuil, coriandre ou aneth et à partir du 15 mai le basilic.

En résumé pour l'espace "Ratatouille"

- Planter à partir du 15 mai (hors abri) les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments et les courgettes.

Espace "Soupe de courges 2017"




Concernant l'espace "Soupe de courges" qui répond aux mêmes exigences que l'espace "Ratatouille", le jardinier repique la 2ème quinzaine de mai les différentes espèces de courge, de potiron ou de citrouille en respectant les distances de

plantations. Il les protégera des limaces en mettant un pot percé autour et dépassant de 3 à 5 cm. 3 à 5 granulés d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur.

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"

- Planter toutes les courges à partir du 15 mai.



Travaux en Mai 2017

Les massifs de plantes

Les bulbes de printemps (narcisses, jonquilles, muscaris, tulipes, ...) sont défleuris, le jardinier coupe leur hampe florale et attendra début juin pour couper de moitié les feuilles. Le jardinier plante les bulbes d'été, les dahlias, ...


Le jardinier sème directement en pleine terre toutes les annuelles: achillée, capucine, cléome, cosmos, lavatère, lin, oeillet d'Inde, pétunia, reine-marguerite, souci, ... Afin de réussir ses semis, il doit semer clair. il peut ajouter du sable au graines.



Toutes les plantes annuelles ou vivaces achetés en godets sont repiqués en pleine terre début mai en respectant les distances de plantation. Pour rappel, la distance de plantation

entre 2 plantes correspond à sa hauteur une fois adulte.

Les plantes de rocailles achetées en godets ou échangées lors de trocs de plantes sont plantées jusqu'à fin mai.



La pelouse

Avec une fin avril et un début mai pluvieux, les graminées vont pousser après plusieurs semaines d'absence de pluie! Une tonte au-dessus de 60 mm et en lune descendante fait moins repousser l'herbe! Les déchets de tonte sont déposés aux pieds des arbustes (couches de 3 à 5 cm). Elles sont aussi étendues en fines couches sur le potager (1 cm). Si le jardinier souhaite pailler les plantes avec de la paille, il est conseillé de mettre une couche de déchet de tonte avant de mettre celle de paille. Cette technique limite la faim d'azote pour les sols

peu poussant. Sinon, la paille est déposée en juin une fois les plantes bien enracinées.

Si le jardinier ne souhaite plus ramasser l'herbe, il peut la laisser sur place. Les tontes doivent être alors plus nombreuses (tous les 8 jours). L'achat d'une tondeuse mulcheuse est vraiment conseillé. Enfin, le jardinier peut choisir la pousse libre sur une partie de son espace engazonné: la prairie de fauche. Il la fauchera fin juillet puis en septembre. Les tontes riches en graines ne sont pas utilisées comme paillis au potager; elles le sont au verger.

L'aire de compostage

Malgré les coups de froids, les organismes de l'aire de compostage en tas ou en bacs sont en pleine activité. Il est important de bien brasser les déchets en surface du bac, à la fourche et 1 à 2 fois par semaine. Les déchets vieux de 3 mois peuvent être épandus comme paillis dans les espaces

«Ratatouille» ou "Plat de courges" du potager; ils sont recouverts d'une fine couche de déchets de tonte ou de déchiquetats de taille d'arbustes. La litière de matières organique est recrée, c'est comme en forêt!

La jardinière ou les plantes en pots

La jardinière offre un espace végétal, coloré et parfois odorant, sur la terrasse, le balcon ou dans le patio. Elle est facile à créer mais son entretien au quotidien demande un peu de vigilance.

Le jardinier doit associer des plantes ayant des caractéristiques proches concernant :

- L'exposition (soleil, mi-ombre, ombre),
- Le besoin en eau (arrosage fréquent ou plus espacé),
- La vigueur (pour éviter les prédominances),
- Le type de terreau,
- Concernant la couleur des fleurs ou des feuillages, ce n'est qu'une question de goût et chacun doit garder son style !

Comment créer une jardinière?

- Au fond de la jardinière, déposer une couche drainante d'1 cm de graviers,
- Remplir au 2/3 d'un terreau "géranium et



plantes fleuries" du commerce ou d'un mélange personnel (1/3 sable + 1/3 compost mûr + 1/3 terre de jardin ou 1/2 compost mûr + 1/2 terre de jardin),

- Pour les plantes ayant besoin d'un substrat plus acide, utiliser un terreau dit « de bruyère »,
- Mélanger au terreau de la corne broyée,
- Disposer régulièrement les plantes, une tous les 10 cm et en quinconce pour les jardinières les plus larges,
- Tasser légèrement et compléter, si nécessaire, de terreau,
- Déposer un paillis en surface

(paillettes de lin, broyat de feuilles, coques de cacao).

Côté entretien!

- Plus l'exposition est plein soleil, plus les arrosages sont fréquents,
- Oter régulièrement les fleurs fanées,
- Pour avoir des jardinières luxuriantes, apporter un engrais organique solide ou liquide.

Infusions, décoctions, ... !

Tout le long des paragraphes, le jardinier retrouve des conseils permettant de se passer de pesticides (texte en rouge). Sont privilégiés des solutions simples et souvent gratuites: infusions, décoctions, extraits

fermentés... Bien entendu, le jardinier peut faire le choix d'acheter les préparations prêtes à l'emploi et vendues chez les spécialistes membres du Club.

Infusion

Faire frémir de l'eau de pluie, éteindre puis plonger les plantes coupées (100g/l). Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Décoction

Plonger les plantes coupées (100g/l) dans de l'eau puis faire frémir l'eau de pluie pendant 20 mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Extrait fermenté

Plonger les plantes (1000g/10l) dans un bidon rempli d'eau de pluie à 15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent et sur plusieurs jours. La fermentation va rapidement débuter. Une fois finie, filtrer avec précaution puis mettre dans des bidons qui seront entreposés au frais et à l'ombre (cave, ...). Utiliser dilué sur 6 mois. En règle générale pour la dilution: un verre d'extrait + 4 d'eau pour l'arrosage, et un d'extrait + 19 d'eau pour la pulvérisation.

Macération non fermentée

Faire macérer les plantes coupées (100g/l), 24 h, dans de l'eau de pluie et à 15/20°C. Filtrer. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Autres infos:

- Si le jardinier utilise des plantes sèches, la quantité est de 30g/l.
- Les plantes ne sont pas mélangées avant, mais après "la cuisine".
- La pulvérisation est faite le soir.

Le jardin au quotidien !

Même si le jardinier ne croît pas au calendrier lunaire, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de différents travaux au jardin.

En Mai 2017 ...

Jardiner avec la lune, c'est bien! Mais il faut privilégier les conditions extérieures: sol ressuyé, conditions climatiques adaptées et ... l'envie du jardinier!

1	Jour fleur: Plantation des chou-fleur, chou-brocoli, chou-romanesco,...	Lune descendante	22	Jour feuille: Semis des salades (laitue, chocé, ..), blettes, des choux à feuilles, des poireaux, ...	Lune descendante
2	Jour feuille: Plantation des choux de Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non, laitue et des plantes aromatiques en pot (persil, cerfeuil, ...).		23		
3			24	Jour fruit: Semis de haricot nais ou râmes, de courges, concombres, melons, ...	
4	Noeud lunaire: Ne rien faire		25	Jour racine: Semis de carottes, navets, panais, radis, ...	
5	Jour fruit: Plantation sous abri (ou pas) des aubergines, des poivrons et des tomates, et plantation des courgettes et courges, ...		26	Péigée: Ne rien faire	
6	Jour racine: Plantation des premiers céleris raves, ...		27	Jour racine: Semis de carottes, navets, panais, radis, ...	
7	Ne pas oublier en lune descendante: tonte de la pelouse, travail du sol, paillage et fertilisation organique.		28	Jour fleur: Plantation des chou-fleur, brocoli, Romanesco, ...	
8			29	Jour feuille: Plantation des choux de Bruxelles, chou frisé, chou pommé ou non, et des salades (laitues, chicorée, ...).	
9			30		
10	Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs, des chou-fleur, brocoli, Romanesco,...		31	Jour fruit: Plantation des aubergines, des courgettes, des poivrons, tomates, ...	
11		Lune ascendante	... puis début Juin !		Lune descendante
12	Apogée: Ne rien faire		01	Jour fruit: Plantation sous abri (ou pas) des aubergines, des poivrons et des tomates, et plantation des courgettes, courges et autres cucurbitacées.	
13	Jour feuille: Plantation des choux à feuilles et des salades.		02		
14	Jour fruit: Semis de courgettes pour une deuxième plantation, de concombres, de cornichons, melons, de courges et autres cucurbitacées, de haricots nains ou à râme, du mais,		03	Jour racine: Plantation des céleris, des poireaux.	
15			04	Ne pas oublier en lune descendante: tonte de la pelouse, travail du sol, paillage et fertilisation organique.	
16			05		
17	Jour racine: Semis de carottes, navets, panais, persil tubéreux, radis, ...		06	Jour fleur: Plantation des annuelles à fleurs, des chou-fleur, brocoli, Romanesco, ...	
18			07	Plantation des vivaces, annuelles à fleurs (géranium, ...).	
19	Noeud lunaire: Ne rien faire		08	Jour feuille: Plantation des choux à feuilles et des salades.	
20	Jour fleur: Semis des chou-fleur, brocoli, Romanesco, ...		09	Apogée: Ne rien faire	
21	Jour feuille: Semis des salades, blettes, des choux à feuilles, des poireaux, ...		10	Jour fruit: Plantation des courgettes, courgettes et autres cucurbitacées	

Encore plus simple !


- En Lune descendante: tous les travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de multiplication avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe (tronçonnage, élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique.
- En Lune ascendante: tous les travaux de semis.

UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

Les Chancres

Les chancres peuvent avoir de très nombreuses origines. Ils sont causés par des champignons (notamment des rouilles) ou des bactéries qui obstruent les vaisseaux de la sève et finissent par causer des symptômes au niveau de l'écorce.

Les chancres causés par des champignons présentent souvent des dépressions ou des crevasses plus ou moins étendues. De couleur sombre elles conduisent à la chute de l'écorce ou la pliure de la tige du fait de la destruction des vaisseaux conducteurs de sève.



Les chancres bactériens sont relativement similaires à la différence près qu'ils sont très souvent associés à des sécrétions visqueuses. Ils sont souvent la conséquence de chocs mécaniques qui blessent la plante et laissent entrer le ravageur.

Biologie

- Les champignons responsables de la plupart des chancres fongiques sont: *Coryneum* et *Nectria*. Leurs spores sont entraînées par le vent puis s'installent partout où l'écorce offre un point d'entrée comme les plaies de taille, les cicatrices foliaires, les fissures de l'écorce, les coups de tondeuse ou de véhicules, les liens trop serrés... Un arbre infesté peut très facilement contaminer les arbres voisins.
- Les chancres bactériens infestent principalement les arbres fruitiers. Ils sont provoqués par des bactéries du genre *Pseudomonas*. Ils naissent principalement en automne quand les feuilles sont tombées et que les arbres commencent à entrer en dormance. Dès l'été, les bactéries sont présentes sur les feuilles âgées et les organes verts de l'arbre. A la différence des chancres fongiques, elles ne proviennent pas de chancres existants.

Moyens de lutte

- Évitez la stagnation de l'eau au pied des plantes,
- Vérifiez l'état sanitaire de la plante à l'achat avant son introduction au jardin,
- Pour limiter au mieux les attaques sur les arbres, ne les affaiblissez pas par des tailles drastiques et évitez de les blesser en travaillant le sol ou en débroussaillant,
- Éliminez les branches mortes afin qu'elles ne soient pas des points d'entrée pour les pathogènes, en respectant l'orientation de la coupe favorisant l'écoulement de l'eau,
- En cas de taille sur une plante malade, désinfectez les outils avec de l'alcool pour ne pas contaminer d'autres plantes. Les arbres malades sont toujours taillés en derniers,
- Éliminez également les parties malades et détruisez-les afin de ne pas propager l'infection. Le chauffage ou la cuisson au bois est une bonne solution d'élimination!

Les mois précédents ...

Mai 2016	La Fumagine
Jun 2016	La Psylle du Poirier
Jul 2016	Les Mineuses
Aou 2016	La Cochenille du Fusain
Sep 2016	L'Entomosporiose du Poirier
Oct 2016	La Puceron lanigère du Pommier
Nov 2016	La Puceron noir du Dahlia
Déc 2016	La Moniliose des arbres fruitiers
Jan 2017	La Mouche du semis
Fév 2017	La Rouille du Prunier
Mar 2017	Le Botrytis de l'Oignon
Avr 2016	Le Tarsonème du Fraisier



Extraits de textes et photos : <http://www.jardiner-autrement.fr>

RELAIS, LES ANNONCES EN MAI 2017

Vous souhaitez passer une annonce!

Elle peut concerner:

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, ...),
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, ...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

FFP

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/>

La Ville et
l'Eurométropole
de Strasbourg

Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Jean-Louis AMANN, Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
jean-louis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3ème / Strasbourg et EMS -
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu et www.cap-territorial.fr

Groupe d'Étude
et de Protection
des mammifères
d'Alsace

Le GEPMA, association régionale à but non lucratif, mène depuis plusieurs années des actions de sensibilisations auprès du grand public pour échanger autour des mammifères, et plus largement de la biodiversité alsacienne.

Le GEPMA vous propose, via la mise en place de stands et/ou d'animations scolaires, de réaliser une ou plusieurs actions visant à sensibiliser les habitants de votre commune à leur environnement, le tout dans une ambiance conviviale. De nombreux outils pédagogiques ont été créés dans ce but et sont adaptés en fonction du public.

Vous êtes intéressés pour accueillir un stand ou faire profiter vos écoles d'animations scolaires, et vous voulez obtenir plus d'informations ?

Contactez Julie Roux par mail j.roux@gepma.org ou par téléphone au 03 88 22 53 51

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-composter>

<http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/>