



DES NOUVELLES DU CLUB

Le Club compte 186 membres personnes morales (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS.

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

LES INITIATIVES DES MEMBRES

Un jardin des sens fédérateur !

Plusieurs services de la commune d'Eschau se sont réunis pour offrir un « Jardin des sens » ouvert non seulement aux jeunes mais également à l'ensemble des familles. Centre de loisirs « Les Petits Loups », Multiaccueil « Les Galipettes », Ecole de musique, Médiathèque, espace jeunes... Tous ont mis leur imagination au service d'un jardin pas comme les autres. Utiliser tous ses sens pour percevoir le monde qui nous entoure... voilà qui n'est pas nouveau, mais qui prend un sens tout particulier quand il s'agit de créer un vécu émotionnel au plus près de la nature.

Un jardin pour pouvoir toucher, sentir, goûter, regarder, écouter, prendre conscience de l'importance de son environnement, le respecter, l'aimer... des matériaux de

récupération... une envie de partager... une mise en œuvre qui a séduit l'ensemble des participants.



Photo et texte: Commune d'Eschau

Au programme de ce mois

Des nouvelles du Club	page 1
Les initiatives des membres	page 1
Infos, côté jardin	page 2
- Le jardin de Juillet à début Août	
Infusions, décoctions, ...!	page 8
Le jardin au quotidien	page 9
Une maladie, un ravageur	page 10
- Le Balanin des Noisetiers	
Relais les annonces	page 11

Une démarche qui invite les Strasbourgeois à jardiner leur ville ! Vous pouvez découvrir les différents espaces à jardiner de Strasbourg: jardins familiaux, jardins partagés, potagers urbains collectifs, jardins d'école, lieux de cueillettes... <http://www.strasbourgcapousse.eu>



INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin d'Août à début septembre

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

En raison des périodes de fortes chaleurs de juin et de juillet, des arbustes plantés au printemps peuvent avoir souffert par manque d'eau. La taille des parties sèches ou d'une partie de la plante est nécessaire pour favoriser un nouveau démarrage de la végétation. Un paillage généreux est indispensable. Pourquoi ne pas utiliser les parties mortes broyées pour pailler ces arbustes?

Sinon, le jardinier poursuit la taille **des arbustes à feuilles (troènes...) ou à fleurs (forsythia, spirée blanche...)** commencée au printemps.

Les rosiers sont en pleine floraison. Les fleurs sont coupées afin de favoriser de nouvelles. (voir Relais l'INFO de juin 2017).



Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes!

Les attaques des prédateurs sont très souvent stoppées par les auxiliaires (coccinelles, guêpes

solitaires, forficules, etc). Au quotidien, le sécateur permet d'enlever les parties malades. Elles peuvent être déposées, déchiquetées à la tondeuse ou broyées, dans un autre espace du jardin comme le potager ou les massifs de plantes vivaces.

Les invasions de pucerons peuvent être limitées grâce à des pulvérisations d'infusions de mélisse ou de sauge (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation sans dilution), ou à des macérations froides de feuilles de rhubarbe (100g de plantes fraîches/litre d'eau et pulvérisation sans dilution). Le jardinier peut aussi utiliser du savon noir.

Pour prévenir l'attaque de maladies en raison d'une météo fraîche et pluvieuse fin juillet, le jardinier peut pulvériser les arbres avec une décoction de prêle (100g de plantes fraîches/litre ou 30g de plantes sèches/litre d'eau et pulvérisation avec une dilution à 20%). En cas d'attaque (blanc ou oidium, etc), il fait une application de bicarbonate de soude (5g/litre d'eau) ou de lait dilué à de l'eau à 50%. L'ajout de savon noir renforce leur action (1 cuillère à café/litre).

Les arbres fruitiers et les petits-fruits

Août est encore le mois de la taille **des arbres fruitiers** dite «taille en vert». Les pousses éliminées, le développement des autres est privilégié. La cicatrisation naturelle des plaies de taille est facilitée. Il n'est pas nécessaire de mettre un produit cicatrisant; par contre il est important de faire des "coupes propres" avec des outils bien aiguisés et désinfectés à l'alcool à brûler. Les déchets de tailles sont broyés à la tondeuse thermique ou au broyeur et servent de paillis au potager.



Les récoltes de cerises jusqu'en juillet ont été inégales selon les secteurs. Si le jardinier avait décidé de ne pas tout récolter, il est important de faire chuter les derniers fruits lorsqu'ils sont en surmaturité. Cette précaution évite leur transformation en fruits

momifiés, véritables foyers de maladies au printemps suivant.

Les pommes et les poires grossissent avec les dernières pluies. Leurs variétés précoces commencent à être récoltées. Leur conservation est de quelques jours. Dès que "la couleur tourne au jaune", il faut les consommer. "Passées", les fruits sont farineux. Ces derniers peuvent être transformés en confiture en mélange avec des petits fruits, des fruits à noyaux ou des baies sauvages.



Plusieurs variétés de prunes sont récoltées comme les mirabelles ou les Flotow (prunes jaunes avec un noyau adhérent ramenées du front russe par les alsaciens enrôlés de force lors de la 2ème Guerre mondiale). La récolte de prunes demande au moins 2 passages pour améliorer la maturation des fruits.

Concernant les espaces de petits fruits, le jardinier poursuit les cueillettes des mures, sauvages ou cultivées, ou d'autres croisements (Loganberry, Muroise, etc).



Côté entretien, les cannes de framboisiers ayant produit ou celles desséchées sont rabattues et servent, si elles sont malades ou infestées, de "petits bois" pour le barbecue, sinon de paillis. Les nouvelles cannes sont attachées aux fils ou aux piquets. Leur paillis est complété de déchets verts

ligneux. Les autres arbustes à petits fruits seront taillés à l'automne afin de préserver les rameaux pour le bouturage d'automne.

Les fraisiers remontants dits des "4 saisons" sont en production. Les stollons issus des pieds mères des fraisiers remontants ou non remontants poussent dans tous les sens. Ils pourront être replantés d'août à octobre pour créer des lignes ou des planches supplémentaires de fraisiers. Le jardinier peut garder les pieds pendant 4 ans. Sinon, les stollons sont éliminés pour ne pas épuiser les pieds mères.



Quelques conseils pour protéger son verger et ses petits fruits!

Le jardinier peut poursuivre l'installation des bandes engluées à mi-hauteur autour des troncs ou à la base des premières charpentières si ces derniers sont couverts de lierre. Elles piègeront les chenilles défoliatrices de printemps que sont les cheimatobies. Les bandes sont changées tous les 15 jours ou sont reconstituées de glu.

En présence de prédateurs ou pour prévenir les attaques de maladies (tavelure, oidium, cylindrosporiose, etc), le jardinier peut se référer aux alternatives aux pesticides du paragraphe "Arbres, arbustes et arbrisseaux".

Les feuilles malades sont ramassées et servent de paillis dans un autre espace du jardin comme le potager.


Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.



- L'espace « Ratatouille » : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
- L'espace « Plat gros volumes » : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.
- L'espace "Soupe de courges" : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades et les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire d'Août à début Septembre

Espace "Potée 2017"



Les carottes et les panais se développent bien. Les semis de juin sont inégaux en raison des périodes de canicules. Un léger paillis de tontes de gazon ou de broyat de taille peut être déposé entre les rangs de ces 2 légumes-racines.

Les poireaux dits de conservation sont repiqués profondément au plantoir (15 cm sur le rang et 30 cm entre). Avant de les planter,

le jardinier veillera à les «habiller» en rabattant la partie supérieure et en diminuant le chevelu racinaire.



Les céleris raves grossissent après les pluies de juillet. Les feuilles de la base sont enlevées pour favoriser le grossissement des raves. Ces déchets très odorants, donc très insectifuges, sont déposés aux pieds des poireaux. Des apports mensuels de compost bien décomposé sont favorables à ce légume-racine. Un paillis léger complète leur action nourricière (tontes, etc).

Depuis juin, le jardinier récolte choux pommés,

choux-raves ou choux-fleurs plantés précocement. Les choux sont paillés surtout ceux à fleurs qui demandent un apport d'eau régulier (choux fleurs, brocoli, Romanesco, etc). Les derniers choux d'hiver sont à repiquer et notamment les fameux choux à feuilles (choux frisés, cavalier, palmier, kale, etc). Les choux-navets ou rutabagas sont éclaircis à 30 cm.



Les concombres sont en pleine fleur et les productions se poursuivent en août. Les tiges s'accrochent vigoureusement au grillage. Les feuilles de la base qui sont jaunes ou couvertes d'un duvet blanc sont éliminées puis compostées à chaud.

Les topinambours ou les crosnes continuent leur développement. Les premiers vont atteindre les 2 m grâce aux pluies abondantes de fin juillet.



Pour boucher les trous! Après la récolte des carottes ou des choux, les parties vides peuvent servir au repiquage de salades semées en pépinière, (laitues, chicorées, mâche), ou au semis de navets (Boule d'or), de betteraves rouges (Crapaudine, d'Egypte) ou de blettes.

Quelques conseils pour protéger l'espace potée!

La pose d'un voile anti-insecte limite voire empêche les attaques de la teigne ou de la mouche des poireaux. La pulvérisation d'infusion de sauge, de mélisse citronnelle ou de tanaisie (100g de plante fraîche/litre d'eau et pulvérisation sans dilution) complète cette protection à condition que la pression des 2 insectes soit faible.

Pour prévenir l'apparition de la rouille sur les feuilles de céleris due à un champignon, des pulvérisations de décoctions de prèles (100g de plante fraîche/litre et pulvérisation avec une dilution à 20%) assurent une protection. Une pulvérisation de savon noir ou à base d'extraits de plantes odorantes (menthe, lavande) est à prévoir en cas d'attaque d'aleurodes (moucheron blancs) sur les choux.

En résumé pour l'espace "Potée "

- Semer en pleine terre dans les espaces libres de la mâche, des betteraves-rouges et des navets blancs ou de Nancy.
- Repiquer les différents choux et les poireaux et les salades, laitues ou chicorées, dans les espaces libres.
- Semer en pépinière différentes salades (laitues ou chicorées) pour occuper les espaces libres.


Espace "Plat gros volumes 2017"

Les pieds de pommes de terre sont exceptionnels cette année; la récolte 2016 n'est plus qu'un mauvais souvenir! Bien que les doryphores n'aient pas été très virulents en juin et juillet, ils peuvent encore être efficaces en août. Le jardinier doit les ramasser manuellement; il n'existe pas de traitement efficace applicable par le jardinier amateur.

Les haricots verts nains ont un fort développement. Début août est encore le bon moment pour en semer; leurs récoltes seront prévues fin septembre à début octobre. Une fois les gousses récoltées, la partie supérieure est cisailée sur place. Les racines



sont laissées dans le sol. Les haricots à rames atteignent les 2 à 3 m en août. Le buttage des haricots semés en juillet est vraiment favorable pour augmenter leur enracinement et leur tenue. Ce légume aimant la potasse, le jardinier peut déposer de la cendre de bois entre les rangs.



Les parties vides laissées par les haricots verts ou les petits-pois peuvent servir au repiquage de salades, (laitues, chicorées, mâche), ou au semis de navets (de Nancy, Boule d'or, etc), de betteraves rouges (Crapaudine, de Détroit, etc) ou de blettes.

En résumé pour l'espace "Plat gros volumes"

- Semer en pleine terre les haricots nains.
- Dans les espaces vides laissés par les haricots, petits-pois ou fèves, repiquer les salades ou semer betteraves rouges, blettes ou navets.
- Semer en pépinière les laitues de printemps pour être repiquées ensuite en pleine terre dans cet espace; elles occuperont les espaces libres.

Espace "Ratatouille 2017"

La récolte se poursuit pour l'ail, l'oignon ou l'échalote. Arrachés, les plants sont laissés sur place pour les faire sécher. Ils sont ensuite déposés dans des cageots ou tressés, et enfin remisés au sec.



La cueillette **des tomates, des aubergines ou des poivrons** se poursuit activement! Le jardinier dépose en continu sur et entre les rangs de ces légumes-fruits 3 à 5 cm de broyat de taille ou 1 cm de tonte de gazon. Grâce au paillis, le nombre d'arrosage est de 1 à 2 par semaine. Il se fait obligatoirement aux pieds des plantes pour ne pas mouiller leur feuillage. Pour les jardiniers ayant fait le choix d'enlever les gourmands, ces derniers sont retirés le plus tôt possible afin de limiter les plaies de taille propices à l'entrée de maladies. Les feuilles de la base jaunissent; elles sont aussi éliminées.



Les aubergines, noires ou blanches (photos), sont souvent attaquées par les doryphores. Une surveillance journalière est obligatoire. Les poivrons ou les piments (photo) peuvent produire en abondance. Un tuteur est à prévoir, car les fruits sont lourds et les pieds fragiles.



Les **courgettes** sont en pleine production. Elles sont paillées de déchets verts (mauvaises herbes non montées en graines, etc). Un arrosage est nécessaire tous les 2 jours en l'absence de pluie.



Les **plantes aromatiques** sont cueillies au quotidien. L'été est propice à leur séchage au soleil sur des claies ou suspendues aux fils d'étendage à linge.



Quelques conseils pour protéger l'espace Ratatouille!

Le mildiou provoque sur les feuilles de tomates des taches huileuses. Des halos noirs peuvent apparaître sur les tiges et s'y développer. Une pulvérisation de bicarbonate de soude est assez efficace. Son pH basique empêche les spores de champignon de germer. Le jardinier doit dissoudre 5 g (1 cuillère à café) de bicarbonate de soude par litre d'eau et ajouter 1 cuillère à café de savon noir, afin que la solution couvre mieux les feuilles. En cas d'attaque, les feuilles malades et les pieds arrachés sont cisailés menus et compostés à chaud avec des tontes de gazon, sinon elles sont déposées aux pieds de haies ou au verger.

En cas d'attaques d'oidium (feutrage blanc) des courgettes, une pulvérisation de lait de vache dilué à 50% est assez efficace. L'oidium se développe surtout si les températures sont supérieures à 25°C. Les feuilles sont coupées à ras puis sont compostées à chaud.



Espace "Soupe de courges 2017"

Les pieds des différentes variétés de courges se développent en tout sens avec les pluies de fin juillet. Le jardinier doit veiller à laisser courrir les rameaux pour qu'ils puissent s'enraciner sur un sol ameubli et surtout couvert d'un paillis épais de déchets plus ou moins grossiers. Ils peuvent être arrêtés à la 4ème feuille après le fruit.

Les premiers fruits seront récoltés ce mois surtout ceux des variétés dont les fruits sont cueillis au stade jeune pour être consommés comme courgettes (Longue de Nice, etc).



En résumé pour l'espace "Ratatouille"

- Enlever ou pas les gourmands des tomates.
- Surveiller les attaques des prédateurs ou des maladies.
- Pailler avec abondance et avec différents déchets verts .

En résumé pour l'espace "Soupe de courges"

- Laisser pousser!

Espaces gastronomiques d'Août à début septembre 2017

Salades après petits-pois Bettes après fèves Pommes de terre Haricots rames Haricots nains Haricots nains Salades après haricots	Salades ou radis après ail, oignon et échalote Tomates Aubergines Poivrons Courgettes	Panais Carottes Choux Salades Carottes Poireaux Céleris Carottes Poireaux Poireaux Choux	Courges
Espace 2017 « Plat gros volumes »	Espace 2017 « Ratatouille »	Espace 2017 « Potée »	Espace 2017 « Soupe de courges »

Travaux en Août 2017

Les massifs de plantes

Pour favoriser de nouvelles floraisons, les fleurs fanées sont coupées. Ces déchets quotidiens servent de paillis. Le jardinier peut semer en godet de nombreuses espèces de plantes dites de rocailles. Il

les repiquera à l'automne. Il sème aussi les pensées qui animent de leur couleur les ambiances automnales ou hivernales.

La pelouse

En ce début de mois d'août, certaines pelouses très sèches suite à la canicule reverdissent! Il est important d'enlever quelques plantes indésirables qui peuvent proliférer grâce aux espaces laissés libres!

Épandre de l'engrais n'est pas nécessaire. Une urine dans un arrosoir additionnée de cendres de bois apporte des nutriments qui revitalisent la pelouse.

L'aire de compostage

Les aires de compostage en tas ont un peu souffert des périodes de canicule surtout celles situées en plein soleil. Les pluies de fin juillet font faire repartir la phase de décomposition. Les compostiers avec

couvercle utilisés pour une quantité moyenne ou faible de biodéchets offrent plus de flexibilité.

Les déchets compostés depuis plus de 3 mois peuvent être épandus entre les rangs des légumes.

La récup de graines au potager !

Lorsque les inflorescences des légumes deviennent lourdes, le jardinier enfonce des piquets à proximité des plants afin de les soutenir et de les identifier.

Une fois que les inflorescences commencent à jaunir et à dessécher, le jardinier peut débuter la récolte des graines par battage au-dessus d'un tissu. Puis, il opère un tri en enlevant les portegraines. Les graines sont séchées au soleil ou dans un local bien aéré pendant plusieurs jours. Elles sont ensuite conservées dans une enveloppe qui est remise dans un local sec et aéré. Sur chaque enveloppe doivent figurer le nom du légume et la date de récolte.



Infusions, décoctions, ... !

Tout le long des paragraphes, le jardinier retrouve des conseils permettant de se passer de pesticides (texte en rouge). Sont privilégiés des solutions simples et souvent gratuites: infusions, décoctions, extraits

fermentés... Bien entendu, le jardinier peut faire le choix d'acheter les préparations prêtes à l'emploi et vendues chez les spécialistes membres du Club.

Infusion

Faire frémir de l'eau de pluie, éteindre puis plonger les plantes coupées (100g/l). Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Extrait fermenté

Plonger les plantes (1000g/10l) dans un bidon rempli d'eau de pluie à 15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent et sur plusieurs jours. La fermentation va rapidement débuter. Une fois finie, filtrer avec précaution puis mettre dans des bidons qui seront entreposés au frais et à l'ombre (cave, ...). Utiliser dilué sur 6 mois. En règle générale pour la dilution: un verre d'extrait + 4 d'eau pour l'arrosage, et un d'extrait + 19 d'eau pour la pulvérisation.

Macération non fermentée

Faire macérer les plantes coupées (100g/l), 24 h, dans de l'eau de pluie et à 15/20°C. Filtrer. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Décoction

Plonger les plantes coupées (100g/l) dans de l'eau puis faire frémir l'eau de pluie pendant 20 mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Autres infos:

- Si le jardinier utilise des plantes sèches, la quantité est de 30g/l.
- Les plantes ne sont pas mélangées avant, mais après "la cuisine".
- La pulvérisation est faite le soir.

Le jardin au quotidien !

Même si le jardinier ne croît pas au calendrier lunaire, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de différents travaux au jardin.

Jardiner avec la lune, c'est bien! Mais il faut privilégier les conditions extérieures: sol ressuyé, conditions climatiques adaptées et ... l'envie du jardinier!

En Août 2017 ...

1	Jour fleur: Plantation de brocolis, choux-fleur, choux Romanesco.		22		
2	Apogée: Ne rien faire		23		
3	Jour feuille: Plantation en mottes des blettes, chicorées, choux frisés, choux pommés, laitues, poireaux.		24	En Lune descendante: tous les travaux de coupe (tronçonnage, élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique.	
4	Jour fruit: Semis de haricots nains.		25		
5	En Lune ascendante, récolte des légumes-feuilles et des légumes-fruits.		26		
6			27	Jour fleur: Repiquage des fleurs semées les mois précédents en godets.	
7	Jour racine: Semis de betteraves rouges, choux-raves, navets, radis.		28		
8	Noeud lunaire: Ne rien faire		29	Jour feuille: Plantation des salades, laitues et chicorées.	
9	Jour fleur: Semis de plantes de rocailles, de pensées, ...		30	Apogée: Ne rien faire	
10			31	Jour fruit	
11	Jour feuille: Semis de salades, laitue, chicorée ou mâche.		... puis début septembre !		
12			01	En Lune ascendante, récolte des légumes-feuilles et des légumes-fruits.	
13			02		
14	Jour fruit		03		
15	Jour racine: Semis de betteraves rouges, choux-raves, navets, radis.		04	Noeud lunaire: Ne rien faire	
16			05	Jour fleur	
17			06		
18	Périgée: Ne rien faire		07	Jour feuille: Semis de mâche.	
19	Jour fleur: Repiquage des fleurs semées les mois précédents en godets.		08	En Lune ascendante, récolte des légumes-feuilles et des légumes-fruits.	
20	Jour feuille: Plantation des salades, laitues et chicorées.		09		
21	Noeud lunaire: Ne rien faire		10		

Encore plus simple !

- En Lune descendante: tous les travaux de plantation, de rempotage et de repiquage, de multiplication avec émission de racines (marcottage, bouturage, division), de coupe (tronçonnage, élagage et taille), de tonte de la pelouse, de travail du sol, de son paillage et de sa fertilisation organique.
- En Lune ascendante: tous les travaux de semis.

UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

Le Balanin des Noisetiers

Les attaques se repèrent par la présence de trous dans les noisettes. Les noisettes attaquées jeunes tombent précocement et la récolte est donc réduite. Les adultes se nourrissent également de feuillage et de fruits (poires, pêches et kakis notamment) et leurs piqûres provoquent des déformations sur les fruits. Les variétés précoces et celles à coque fines sont les plus sensibles au balanin.

Biologie

La femelle perce la coque des noisettes avec son rostre et pond à l'intérieur, un œuf par noisette. La fécondité des femelles est d'environ 25 à 30 œufs.

Au bout de 8 à 10 jours l'œuf éclot et la larve se développe pendant 40 à 60 jours en se nourrissant de la noisette. Son développement terminé, elle sort et se laisse tomber au sol.

Les larves s'enterrent superficiellement dans le sol et entrent en diapause pendant 1 à 3 hivers avant de se nymphoser.

L'adulte émerge avant l'apparition des noisettes, il se nourrit en attendant de fruits tels que les poires ou les pêches, plus rarement de pommes, de cerises ou de prunes. Lorsque les noisettes commencent à se former il gagne les noisetiers et se nourrit du feuillage et des jeunes noisettes.

Moyens de lutte

- Exposez les larves aux oiseaux et au gel en bêchant légèrement ou en binant au pied des noisetiers attaquées en automne et en griffant en hiver,
- Au printemps, étalez un drap ou une bâche sous les noisetiers et secouez les branches (en tapant quelques coups avec un bâton par exemple) pour en faire tomber adultes et jeunes noisettes attaquées puis les éliminer. Le secouage est à réaliser de préférence tôt le matin lorsque les balanins sont encore engourdis.
- Certaines variétés anciennes ont des coques plus dures et épaisses comme 'Merveille de Bollwiller'. Renseignez-vous auprès du fournisseur.



Les mois précédents ...

Jul 2016	Les Mineuses
Aou 2016	La Cochenille du Fusain
Sep 2016	L'Entomosriose du Poirier
Oct 2016	La Puceron lanigère du Pommier
Nov 2016	La Puceron noir du Dahlia
Déc 2016	La Moniliose des arbres fruitiers
Jan 2017	La Mouche du semis
Fév 2017	La Rouille du Prunier
Mar 2017	Le Botrytis de l'Oignon
Avr 2017	Le Tarsonème du Fraisier
Mai 2017	Les Chancres
Jun 2017	Le Botrytis du Fraisier



Extraits de textes et photos : <http://www.jardiner-autrement.fr>

RELAIS, LES ANNONCES EN AOÛT 2017

Vous souhaitez passer une annonce!

Elle peut concerner:

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, ...),
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, ...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

FFP

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/>

La Ville et
l'Eurométropole
de Strasbourg

Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Jean-Louis AMANN, Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
jean-louis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

Stages collèges réservés aux élèves de 4ème ou 3ème / Strasbourg et EMS -
Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2017

Emploi de gestionnaire du patrimoine arboré - f/H à la Direction Mobilité, espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Date limite de dépôt des candidatures : 06/08/2017

chargé-e des études faune, flore et milieux à la Direction Mobilité, Espaces publics et naturels / Espaces verts et de nature
Date limite de dépôt des candidatures : 20/08/2017

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu et www.cap-territorial.fr

Groupe d'Étude
et de Protection
des mammifères
d'Alsace

Le GEPMA, association régionale à but non lucratif, mène depuis plusieurs années des actions de sensibilisations auprès du grand public pour échanger autour des mammifères, et plus largement de la biodiversité alsacienne.

Le GEPMA vous propose, via la mise en place de stands et/ou d'animations scolaires, de réaliser une ou plusieurs actions visant à sensibiliser les habitants de votre commune à leur environnement, le tout dans une ambiance conviviale. De nombreux outils pédagogiques ont été créés dans ce but et sont adaptés en fonction du public.

Vous êtes intéressés pour accueillir un stand ou faire profiter vos écoles d'animations scolaires, et vous voulez obtenir plus d'informations ?

Contactez Julie Roux par mail j.roux@gepma.org ou par téléphone au 03 88 22 53 51

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-composter>

<http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/>